


No.2 定積分

この回のゴール

- 定積分を「細い長方形の面積の和の極限」（リーマン和）として説明できる.
- 定積分の基本的な性質と、積分の平均値の定理を使える.
- 微分積分学の基本定理を述べ、「微分と積分が逆の操作である」理由を説明できる.
- 定積分を計算し、面積や区分求積法による極限の計算に応用できる.

■ 1. 定積分の定義

高校数学では、定積分を「原始関数 F を使って $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 」と定義し、それが面積を表すことを後から確かめた. 大学では順番が逆になる. まず「面積」を細い長方形の和の極限として定義し、それが原始関数で計算できることを定理として示す（第3節）. こうしておくと、原始関数が分からない関数でも定積分を考えることができる.



定義 1 定積分（リーマン和による定義）

関数 $f(x)$ を閉区間 $[a, b]$ ($a < b$) で考える.

- 区間を $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ と分割し、各小区間 $[x_{k-1}, x_k]$ から点 ξ_k を1つずつ選ぶ.
- 和 $S = \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$ を作る（これをリーマン和という）.
- 小区間の幅の最大値を0に近づけたとき、分割の仕方や ξ_k の選び方によらず S が一定の値に近づくなれば、 f は $[a, b]$ で積分可能であるといい、その値を $\int_a^b f(x) dx$ と書いて定積分という.

また、 $\int_a^a f(x) dx = 0$, $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ と約束する.

$f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$ は長方形（ $f < 0$ なら符号つき）の面積で、記号 $\int$ は和（Summa）の頭文字 S を縦に伸ばしたもので、 dx は「小さな幅」を表している. つまり $\int_a^b f(x) dx$ は「 $f(x) \times$ (幅 dx) を a から b まで足し合わせたもの」と読める.

定理 1

$f(x)$ が閉区間 $[a, b]$ で連続ならば, f は $[a, b]$ で積分可能である. (証明は分野「解析学」第5章 No.1, No.2 に任せる.)

例 1 区分求積法

$\int_0^1 x^2 dx$ を定義どおりに求める. $[0, 1]$ を n 等分し, $\xi_k = \frac{k}{n}$ (各小区間の右端) とすると

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad (n \rightarrow \infty).$$

x^2 は連続なので積分可能で (定理 1), 等分割の特別な場合の極限が定積分の値に一致する. よって $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$.

2. 定積分の性質

リーマン和の性質から, 次のことが分かる (長方形の面積の和で考えれば自然である).

定理 2 定積分の性質

f, g は積分可能とする.

$$(1) \text{ (線形性) } \int_a^b \{kf(x) + lg(x)\} dx = k \int_a^b f(x) dx + l \int_a^b g(x) dx \quad (k, l \text{ は定数})$$

$$(2) \text{ (区間の加法性) } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$(3) \text{ (単調性) } a < b \text{ で, } [a, b] \text{ でつねに } f(x) \leq g(x) \text{ ならば } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

$$(4) a < b \text{ ならば } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

(2) は定義 1 の最後の約束のおかげで, a, b, c の大小によらず成り立つ. (3), (4) では $a < b$ が必要であることを注意しよう.

定理 3 積分の平均値の定理

$f(x)$ が $[a, b]$ で連続ならば,

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a), \quad a \leq c \leq b$$

を満たす c が存在する.

【証明】 最大値・最小値の定理 (第1章 No.1 定理 7) より, f は $[a, b]$ で最小値 m , 最大値 M をとる. $m \leq f(x) \leq M$ を積分して (定理 2 (3))

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a), \quad \text{すなわち} \quad m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$


中間値の定理 (第1章 No.1 定理 6) より, f は m と M の間の値をすべてとるので, $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

となる c がある. □

$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ は f の $[a, b]$ における**平均値**で、「面積を幅で割った高さ」である. 定理3は「平均値は、 f がどこかで実際にとる値である」と言っている.

■ 3. 微分積分学の基本定理

積分の上端を変数 x にした関数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ を考える. $F(x)$ は「 a から x までの (符号つき) 面積」である.



定理 4 微分積分学の基本定理 (1)

$f(x)$ が区間 I で連続で, $a \in I$ とする. $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ とおくと, $F(x)$ は I で微分可能で

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

特に, 連続関数には必ず原始関数が存在する.

【証明】 $h \neq 0$ とすると, 定理2(2)と積分の平均値の定理(定理3)より

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h)$$

となる c_h が x と $x+h$ の間にある. $h \rightarrow 0$ のとき $c_h \rightarrow x$ なので, f の連続性より $f(c_h) \rightarrow f(x)$. ($h < 0$ のときも, $\int_x^{x+h} = -\int_{x+h}^x$ に注意すれば同じ式になる.) □

図で言えば, 「面積の増え方 (F') は, そこでの高さ (f) に等しい」ということである.

定理 5 微分積分学の基本定理 (2)

$f(x)$ が $[a, b]$ で連続で, $G(x)$ をその原始関数の1つとすると

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) = \left[G(x) \right]_a^b.$$

【証明】 定理4の $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ も原始関数なので, No.1 定理1より $G(x) = F(x) + C$. よって $G(b) - G(a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt - 0$. □

こうして, 「面積 (リーマン和の極限)」と「微分の逆 (原始関数)」という, まったく別の考え方から来た2つのものが結びついた. 高校で定義として覚えた公式は, 大学ではこの定理として証明されるのである.

注意

$\int_a^x f(t) dt$ の t は積分の中だけで使われる文字（積分変数）で、 $\int_a^x f(s) ds$ と書いても同じものを表す。上端の x と区別するために別の文字を使っている。 $\int_a^x f(x) dx$ と書くと、どの x が何を表すのか分からなくなるので避けよう。

例題 1

次の関数を x で微分せよ。

$$(1) \int_0^{x^2} \sin t \, dt \quad (2) \int_x^{2x} e^{t^2} \, dt$$

【解答】 (1) $F(u) = \int_0^u \sin t \, dt$ とおくと、与えられた関数は $F(x^2)$ 。合成関数の微分と定理 4 より $\frac{d}{dx} F(x^2) = F'(x^2) \cdot 2x = 2x \sin(x^2)$ 。

(2) e^{t^2} の原始関数は初等関数では書けないが (No.1 コラム), それでも微分はできる。 $\int_x^{2x} = \int_0^{2x} - \int_0^x$ と分けて、(1) と同様に

$$\frac{d}{dx} \int_x^{2x} e^{t^2} \, dt = e^{(2x)^2} \cdot 2 - e^{x^2} = 2e^{4x^2} - e^{x^2}.$$

■ 4. 定積分の計算と応用

例 2

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = [-\cos x]_0^\pi = 2, \quad \int_1^e \frac{1}{x} \, dx = [\log x]_1^e = 1, \quad \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

定理 6 偶関数・奇関数の積分

f が $[-a, a]$ で連続とする。

$$(1) f \text{ が偶関数 } (f(-x) = f(x)) \text{ ならば } \int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx.$$

$$(2) f \text{ が奇関数 } (f(-x) = -f(x)) \text{ ならば } \int_{-a}^a f(x) \, dx = 0.$$

(グラフの対称性から明らかだが、式で示すには置換 $x = -t$ を使う。No.3 練習問題で確かめよう。)

例題 2 面積

$\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$ の範囲で、2 曲線 $y = \sin x$, $y = \cos x$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

【解答】 2 曲線は $x = \frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$ で交わり、その間では $\sin x \geq \cos x$ 。よって面積は

$$\int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) \, dx = [-\cos x - \sin x]_{\pi/4}^{5\pi/4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2\sqrt{2}.$$

例 1 と逆に、和の極限を定積分で計算することもできる。 f が $[0, 1]$ で連続なら、定義 1 で n 等分・右

端をとって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

例題 3 区分解法による極限

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ を求めよ.

【解答】 $\frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$ なので, $f(x) = \frac{1}{1+x}$ として

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \left[\log(1+x) \right]_0^1 = \log 2.$$

コラム：コンピュータは定積分をどう計算するか

原始関数が分からない関数の定積分（たとえば $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ ）も，定義1のリーマン和を実際に計算すれば近似値が得られる．長方形の代わりに台形で近似すると精度が上がり（台形公式），放物線で近似するとさらに上がる（シンプソン公式）．これらは分野「数値解析」第3章 No.1, No.2 で扱う．「定積分は和の極限」という定義は，計算の現場でもそのまま生きているのである．

■ 練習問題

1. 次の定積分を求めよ.

$$(1) \int_1^2 \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \quad (2) \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx \quad (3) \int_0^1 e^{2x} \, dx$$

$$(4) \int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \quad (5) \int_0^3 |x-1| \, dx$$

2. 定理 6 を使って, 次の定積分を求めよ.

$$(1) \int_{-1}^1 (x^3 \cos x + x^2) \, dx \quad (2) \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin x \, dx$$

3. 次の関数を x で微分せよ.

$$(1) \int_1^x \log t \, dt \quad (x > 0) \quad (2) \int_0^{x^3} e^{-t^2} \, dt \quad (3) \int_x^{x^2} \frac{1}{1+t^2} \, dt$$

4. 曲線 $y = x^2 - 2x$ と直線 $y = x$ で囲まれた部分の面積を求めよ.

5. 次の極限を, 定積分で表して求めよ.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

6. 連続関数 $f(x)$ が $f(x) = x + \int_0^1 t f(t) \, dt$ を満たすとき, $f(x)$ を求めよ.

7. (考えてみよう) $n \geq 2$ とする. $y = \frac{1}{x}$ のグラフと長方形を比べることで,

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \log n$$

を示せ. また, このことから $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ が発散することを説明せよ.

■ 練習問題の解答

1. (1) $\left[\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x}\right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{3} - 1\right) = \frac{17}{6}$.
 (2) $\int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$.
 (3) $\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2}$.
 (4) $\left[\arcsin x\right]_0^{1/2} = \frac{\pi}{6}$.
 (5) $x = 1$ で区間を分けて $\int_0^1 (1-x) dx + \int_1^3 (x-1) dx = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$.
2. (1) $x^3 \cos x$ は奇関数, x^2 は偶関数なので, $0 + 2 \int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$.
 (2) $x^2 \sin x$ は奇関数なので 0.
3. (1) 定理 4 より $\log x$.
 (2) $3x^2 e^{-x^6}$.
 (3) $\int_x^{x^2} = \int_0^{x^2} - \int_0^x$ より $\frac{2x}{1+x^4} - \frac{1}{1+x^2}$.
4. 交点は $x^2 - 2x = x$ より $x = 0, 3$. $0 \leq x \leq 3$ で $x \geq x^2 - 2x$ なので $\int_0^3 \{x - (x^2 - 2x)\} dx = \int_0^3 (3x - x^2) dx = \frac{27}{2} - 9 = \frac{9}{2}$.
5. (1) $\int_0^1 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$.
 (2) $\frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$ より $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}$.
6. $K = \int_0^1 t f(t) dt$ は定数なので, $f(x) = x + K$ と書ける. 代入して $K = \int_0^1 t(t + K) dt = \frac{1}{3} + \frac{K}{2}$.
 よって $K = \frac{2}{3}$, $f(x) = x + \frac{2}{3}$.
7. $k \leq x \leq k+1$ では $\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$ (等号は端点のみ) なので, 定理 2 (3) より

$$\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \log(k+1) - \log k < \frac{1}{k}.$$

右側の不等式を $k = 1, \dots, n$ で足すと $\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$. 左側の不等式を $k = 1, \dots, n-1$ で足すと $\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} < \log n$ で, 両辺に 1 を足せばよい. (等号が端点でしか成り立たない連続関数の積分では, 定理 2 (3) の不等号は $<$ にできる.) $n \rightarrow \infty$ のとき $\log(n+1) \rightarrow \infty$ なので, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \rightarrow \infty$, つまり調和級数は発散する. ($1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ は $\log n$ と同じくらいの速さで, とてもゆっくり大きくなる.)