

No.1 多変数関数と偏微分

この回のゴール

- 2変数関数のグラフと等高線をイメージできる.
- 2変数関数の極限は「近づき方」が無数にあることを理解し、極限が存在しないことを示せる.
- 偏微分係数を定義し、その図形的な意味（断面の接線の傾き）を説明できる.
- 高次偏導関数を計算し、偏微分の順序交換（シュワルツの定理）を使える.

■ 1. 多変数関数

第1章・第2章では、1つの変数 x で決まる関数 $y = f(x)$ を扱ってきた。しかし、たとえば長方形の面積 $S = xy$ は縦 x と横 y の2つで決まり、気温は場所（緯度・経度）と時刻で決まる。この章では、このようにいくつかの変数で決まる関数の微分を学ぶ。

定義 1 2変数関数



平面 $\mathbb{R}^2$ の部分集合 D の各点 (x, y) に、実数 z を1つずつ対応させる規則を **2変数関数** といい、 $z = f(x, y)$ と書く。 D を **定義域** という。空間の点 $(x, y, f(x, y))$ 全体を f の **グラフ** といい、ふつうは曲面になる。

3変数関数 $w = f(x, y, z)$ など同様に定める。以下では主に2変数で説明するが、考え方は変数がいくつあっても同じである。

曲面は紙に描きにくいので、「高さ $f(x, y) = c$ となる点の集まり」を平面に描くことが多い。これを **等高線** という（地図の等高線と同じ）。

例 1

- (1) $f(x, y) = x^2 + y^2$ のグラフは、お椀を上向きに置いた形の曲面（回転放物面）である。等高線 $x^2 + y^2 = c$ ($c > 0$) は原点を中心とする半径 $\sqrt{c}$ の円である。
- (2) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ の定義域は $x^2 + y^2 \leq 1$ で、グラフは半径1の上半球面である。
- (3) $f(x, y) = xy$ の等高線 $xy = c$ は双曲線 ($c \neq 0$) と、2本の座標軸 ($c = 0$) である。



■ 2. 2変数関数の極限と連続性

点 (x, y) と点 (a, b) の距離は $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ である。「 (x, y) が (a, b) に近づく」とは、この距離が 0 に近づくことと考える。

定義 2 2変数関数の極限・連続

- 点 (x, y) が (a, b) と異なる点を取りながら、**どのような近づき方で** (a, b) に近づいても、 $f(x, y)$ が一定の値 α に近づくとき、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = \alpha$ と書く。
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$ のとき、 f は (a, b) で**連続**であるという。

1変数では、 x が a に近づく方向は「右から」と「左から」の2通りしかなかった（第1章 No.1 定理1）。2変数では、まっすぐ近づく方向だけでも無数にあり、曲がりながら近づくこともできる。このことが2変数の極限をずっと難しくしている。（四則演算やはさみうちの原理は、1変数と同じように成り立つ。）

例 2 極限が存在しない例

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ を考える。直線 $y = mx$ に沿って原点に近づけると、 $x \neq 0$ で

$$f(x, mx) = \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{m}{1 + m^2}$$

となり、 m によって値が違ふ（ $m = 0$ なら 0, $m = 1$ なら $\frac{1}{2}$ ）。近づき方で行き先が変わるので、

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ は存在しない。

例題 1

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^2 + y^2} = 0$ を示せ。

【解答】極座標 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$) を使うと

$$\left| \frac{x^2y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{r^3 |\cos^2 \theta \sin \theta|}{r^2} = r |\cos^2 \theta \sin \theta| \leq r.$$

右辺の r は θ に関係なく、 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ のとき 0 に近づく。はさみうちの原理より極限は 0。

注意

- 極座標を使うときは、例題1のように θ によらない評価（ $\leq r$ など）を作ることが大切である。 θ を固定して $r \rightarrow 0$ とするだけでは、直線に沿った近づき方しか調べていない。
- 実際、すべての直線に沿った極限が一致しても、極限が存在するとは限らない。放物線に沿うと違う値になる例がある（練習問題7）。

■ 3. 偏微分

2 変数関数を微分するいちばん素直な方法は、「片方の変数を止めて、もう片方だけを動かす」ことである。

定義 3 偏微分係数・偏導関数


$y = b$ に固定して x だけの関数 $x \mapsto f(x, b)$ と見たときの $x = a$ での微分係数

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}$$

を、 f の (a, b) における x についての偏微分係数という。存在するとき、 f は (a, b) で x について偏微分可能であるという。 y についての偏微分係数 $f_y(a, b) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a, b+k) - f(a, b)}{k}$ も同様に定める。 (x, y) に $f_x(x, y)$ を対応させる関数を偏導関数といい、次のようにも書く。

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} = \partial_x f, \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} = \partial_y f.$$

∂ は「ラウンド・ディー」「デル」などと読む。1 変数の $\frac{d}{dx}$ と区別するための記号である。本によっては f_x を $D_1 f$ と書く。



図形的には、曲面 $z = f(x, y)$ を平面 $y = b$ で切った断面の曲線 $z = f(x, b)$ について、 $x = a$ での接線の傾きが $f_x(a, b)$ である。 $f_y(a, b)$ は、平面 $x = a$ で切った断面の接線の傾きである。

計算するときは、他の変数を定数とみなして 1 変数のときと同じように微分すればよい。

例 3

$f(x, y) = x^2 y + \sin(xy)$ のとき、

$$f_x = 2xy + y \cos(xy), \quad f_y = x^2 + x \cos(xy).$$

(f_x を求めるときは y を定数とみなすので、 $\sin(xy)$ の x での微分は $\cos(xy) \cdot y$ となる.)

偏微分可能でも連続とは限らない

1 変数では「微分可能ならば連続」だった (第 1 章 No.2 定理 2)。2 変数ではこれが成り立たない。例 2 の関数で $f(0, 0) = 0$ と定めると、 $f(x, 0) = 0$, $f(0, y) = 0$ なので $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ と偏微分可能だが、原点で極限をもたないので連続でない (練習問題 5)。偏微分は x 軸方向と y 軸方向の 2 方向しか見ていないからである。「すべての方向をまとめて見た」本当の意味での微分可能性が、No.2 の全微分である。

■ 4. 高次偏導関数

偏導関数をさらに偏微分したものを **2 次偏導関数** という。2 変数では 4 つある。

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{xy} = (f_x)_y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f_{yx} = (f_y)_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

f_{xy} は「先に x 、次に y で偏微分」を表す。 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ では右から順に読むので、順番が逆に見えることに注意しよう。(本によっては f_{xy} の添字の順番の約束が逆のこともある.)

定義 4 C^n 級

f の n 次までのすべての偏導関数が存在して連続であるとき、 f は C^n 級であるという。何回でも偏微分できるとき C^∞ 級という。

定理 1 シュワルツの定理

f_{xy} と f_{yx} がともに存在して連続ならば、 $f_{xy} = f_{yx}$ である。特に、 f が C^2 級ならば偏微分の順序は交換できる。(証明は教科書に任せる。クレローの定理、ヤングの定理などとも呼ばれる.)

例 4

$f(x, y) = x^3y^2 + e^{xy}$ とすると

$$\begin{aligned} f_x &= 3x^2y^2 + ye^{xy}, & f_{xy} &= 6x^2y + e^{xy} + xye^{xy}, \\ f_y &= 2x^3y + xe^{xy}, & f_{yx} &= 6x^2y + e^{xy} + xye^{xy}. \end{aligned}$$

確かに $f_{xy} = f_{yx}$ となっている。

コラム：順序を交換できない関数

$f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$ ($(x, y) \neq (0, 0)$), $f(0, 0) = 0$ とすると、 $f_{xy}(0, 0) = -1$, $f_{yx}(0, 0) = 1$ となり、順序を交換すると値が変わってしまう。この関数では、2 次偏導関数が原点で連続でない。シュワルツの定理の「連続」という仮定は、飾りではないのである。ふだん扱う関数(多項式・指数・三角関数などの組み合わせ)は定義域の内部で C^∞ 級なので、安心して順序を交換してよい。

■ 練習問題

1. 次の関数の偏導関数 f_x , f_y を求めよ。

$$(1) x^3 - 2xy^2 + y^4 \quad (2) e^{2x-3y} \quad (3) \log(x^2 + y^2) \quad (4) \arctan \frac{y}{x} \quad (x \neq 0) \quad (5) x^y \quad (x > 0)$$

2. 3 変数関数 $f(x, y, z) = xyz + x^2z^3$ の偏導関数 f_x , f_y , f_z を求めよ。

3. 次の極限が存在するか調べ、存在するならその値を求めよ。

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad (2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \quad (3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

4. $f(x, y) = x^2y^3 + \sin(x + 2y)$ の 2 次偏導関数をすべて求め、 $f_{xy} = f_{yx}$ を確かめよ。

5. $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ ($(x, y) \neq (0, 0)$), $f(0, 0) = 0$ とする. $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ が存在することを示し, それでも f は原点で連続でないことを説明せよ.
6. $f(x, y) = \log \sqrt{x^2 + y^2}$ は $f_{xx} + f_{yy} = 0$ を満たすことを示せ. (この方程式をラプラス方程式といい, 分野「微分方程式」第6章 No.3 で扱う.)
7. (考えてみよう) $g(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ ($(x, y) \neq (0, 0)$) とする.
- (a) 原点を通るどの直線 ($y = mx$ および $x = 0$) に沿って原点に近づけても, g は 0 に近づくことを示せ.
- (b) 放物線 $y = x^2$ に沿って原点に近づけると, g はいくつに近づくか.
- (c) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g(x, y)$ は存在するか.

■ 練習問題の解答

1. (1) $f_x = 3x^2 - 2y^2$, $f_y = -4xy + 4y^3$.
 (2) $f_x = 2e^{2x-3y}$, $f_y = -3e^{2x-3y}$.
 (3) $f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}$, $f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$.
 (4) $f_x = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$, $f_y = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}$.
 (5) y を定数とみると x^y は x のべき関数なので $f_x = yx^{y-1}$. x を定数とみると指数関数なので $f_y = x^y \log x$.
2. $f_x = yz + 2xz^3$, $f_y = xz$, $f_z = xy + 3x^2z^2$.
3. (1) 存在しない. $y = 0$ に沿うと 1, $x = 0$ に沿うと -1 で, 近づき方によって値が違う.
 (2) 0. 極座標で $\left| \frac{r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)}{r^2} \right| \leq r(|\cos \theta|^3 + |\sin \theta|^3) \leq 2r \rightarrow 0$.
 (3) 0. $\left| \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r} \right| \leq r \rightarrow 0$.
4. $f_x = 2xy^3 + \cos(x + 2y)$, $f_y = 3x^2y^2 + 2\cos(x + 2y)$ より

$$\begin{aligned} f_{xx} &= 2y^3 - \sin(x + 2y), & f_{xy} &= 6xy^2 - 2\sin(x + 2y), \\ f_{yx} &= 6xy^2 - 2\sin(x + 2y), & f_{yy} &= 6x^2y - 4\sin(x + 2y). \end{aligned}$$
5. $f(h, 0) = 0$ なので $f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$. 同様に $f_y(0, 0) = 0$. 一方, 例 2 より直線 $y = x$ に沿うと $f \rightarrow \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$ なので, 原点で連続でない.
6. $f = \frac{1}{2} \log(x^2 + y^2)$ より $f_x = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $f_{xx} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$. 対称性から $f_{yy} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$. 足すと 0.
7. (a) $y = mx$ に沿うと $g(x, mx) = \frac{mx^3}{x^4 + m^2x^2} = \frac{mx}{x^2 + m^2} \rightarrow 0$ ($m \neq 0$ のときは分母 $\rightarrow m^2$; $m = 0$ なら $g = 0$). $x = 0$ に沿うと $g(0, y) = 0$.
 (b) $g(x, x^2) = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2}$ なので $\frac{1}{2}$ に近づく.
 (c) 直線に沿うと 0, 放物線に沿うと $\frac{1}{2}$ で行き先が異なるので, 存在しない.