

No.3 逆行列

この回のゴール

- 正則行列・逆行列の定義を説明でき、逆行列がただ 1 つしかないことを示せる。
- 2 次正方行列が正則かどうかを判定し、逆行列を求められる。
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ などの性質を使える。
- 逆行列を使って連立方程式を解ける。

■ 1. 行列で「割る」には

数の方程式 $ax = b$ は、 $a \neq 0$ なら両辺に $a^{-1} = \frac{1}{a}$ を掛けて $x = a^{-1}b$ と解ける。ここで a^{-1} は「 a と掛けると 1 になる数」である。

行列でも $Ax = b$ を同じように解きたい。ところが行列の割り算は定義されていない。そこで、「 A と掛けると単位行列 E になる行列」を考える。

定義 1 正則行列・逆行列

n 次正方行列 A に対して、

$$AX = XA = E_n$$

を満たす n 次正方行列 X が存在するとき、 A は**正則**である（正則行列である）という。このとき X を A の**逆行列**といい、 A^{-1} と書く。

注意

- 逆行列を考えるのは**正方行列**だけである。
- A^{-1} を $\frac{1}{A}$ と書いてはいけない。行列の割り算は定義していない。
- $AX = E$ と $XA = E$ の**両方**を要求している。積は交換できないので、片方だけでは足りないように見える。実は正方行列なら片方から他方が従うが、それは第 3 章で行列式を使って確かめる。

定義では「 A^{-1} 」と、あたかも 1 つに決まるかのように書いた。それが正しいことを確かめておこう。

定理 1 逆行列の一意性

正則行列 A の逆行列はただ 1 つである。

【証明】 X, Y がどちらも A の逆行列、つまり $AX = XA = E, AY = YA = E$ だとする。結合法則を使うと

$$X = XE = X(AY) = (XA)Y = EY = Y.$$

よって $X = Y$.

□

例 1 正則でない行列

零行列 O は正則でない（何を掛けても O で、 E にならない）。

O 以外にも正則でない行列はある。No.2 の例で $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ は $CD = O$ を満たした。もし C が正則なら、左から C^{-1} を掛けて $D = C^{-1}CD = C^{-1}O = O$ となるが、 $D \neq O$ なので矛盾。よって C は正則でない。

2. 2次正方行列の逆行列**定理 2 2次正方行列の逆行列**

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ とする。

A が正則 $\iff ad - bc \neq 0$.

このとき

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

【証明】 $\tilde{A} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ とおくと、計算により

$$A\tilde{A} = \tilde{A}A = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc)E. \quad (*)$$

($\Leftarrow$) $ad - bc \neq 0$ なら、(*) の両辺を $\frac{1}{ad - bc}$ 倍して $X = \frac{1}{ad - bc}\tilde{A}$ が $AX = XA = E$ を満たす。

($\Rightarrow$) 対偶を示す。 $ad - bc = 0$ とすると (*) より $A\tilde{A} = O$ 。もし A が正則なら、左から A^{-1} を掛けて $\tilde{A} = O$ 、つまり $a = b = c = d = 0$ で $A = O$ 。しかし O は正則でないので矛盾。よって A は正則でない。

□

コラム： $ad - bc$ の正体

$ad - bc$ は、第3章で学ぶ**行列式**（2次の場合）である。幾何的には、2つの列ベクトル $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ が作る平行四辺形の（向き付きの）面積を表す。面積が0、つまり2本のベクトルがつぶれて一直線に並んでしまうと、元に戻す（逆行列を作る）ことができない。

例 2

$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ は $3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1 \neq 0$ なので正則で、

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

実際に $AA^{-1} = E$ となることを確かめてみよう。

公式の覚え方

a と d (対角成分) は入れ替え, b と c は符号を変える, 最後に $ad - bc$ で割る.

■ 3. 逆行列の性質

定理 3 逆行列の性質

A, B を n 次正則行列, c を 0 でない実数とする.

- (1) A^{-1} は正則で, $(A^{-1})^{-1} = A$.
- (2) AB は正則で, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. (順番が逆)
- (3) ${}^tA$ は正則で, $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.
- (4) cA は正則で, $(cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1}$.

「 X が Y の逆行列である」ことを示すには, $XY = YX = E$ を確かめれば十分である (定理 1 により逆行列は 1 つしかないから). この方針で (2), (3) を示す.

【証明】(2) $X = B^{-1}A^{-1}$ とおく. 結合法則を使って

$$(AB)X = A(BB^{-1})A^{-1} = AEA^{-1} = AA^{-1} = E,$$

$$X(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}EB = B^{-1}B = E.$$

よって AB は正則で, 逆行列は $B^{-1}A^{-1}$. □

【証明】(3) No.2 の ${}^t(XY) = {}^tY {}^tX$ を使う.

$${}^tA {}^t(A^{-1}) = {}^t(A^{-1}A) = {}^tE = E, \quad {}^t(A^{-1}) {}^tA = {}^t(AA^{-1}) = {}^tE = E.$$

よって ${}^tA$ は正則で, 逆行列は ${}^t(A^{-1})$. □

例 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ とすると, } A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ で,}$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}, \quad A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

順番を間違えると別の行列になる.

逆行列があれば, 数のときと同じように「両辺を割る」に相当する操作ができる.

定理 4 正則行列は約分できる

A を正則行列とする.

- (1) $AB = AC$ ならば $B = C$.
- (2) $AB = O$ ならば $B = O$.

【証明】(1) 両辺に左から A^{-1} を掛けると $A^{-1}AB = A^{-1}AC$, つまり $B = C$. (2) は (1) で $C = O$ とした場合. □

注意

掛ける向きに注意. $AB = AC$ に対して A^{-1} を右から掛けても $ABA^{-1} = ACA^{-1}$ となるだけで, A は消えない. 行列の等式では「左から掛ける」「右から掛ける」を必ず区別する.

■ 4. 連立方程式への応用

定理 5

A が n 次正則行列なら, 連立一次方程式 $Ax = b$ はただ 1 つの解

$$x = A^{-1}b$$

をもつ.

【証明】 $x = A^{-1}b$ を代入すると $A(A^{-1}b) = Eb = b$ なので, これは解である. 逆に x が解なら, $Ax = b$ の両辺に左から A^{-1} を掛けて $x = A^{-1}b$. よって解はこれ 1 つだけである. $\square$

例題 1

逆行列を用いて, 連立方程式 $\begin{cases} 3x + 5y = 4 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$ を解け.

【解答】 $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ とおくと方程式は $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. 例 2 より $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ なので

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

よって $x = 3, y = -1$.

3 次以上の正方行列の逆行列は, 次回 No.4 の行基本変形を使って求める.

■ 練習問題

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ の逆行列を求め, それを用いて $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 5x + 3y = 8 \end{cases}$ を解け.
2. $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$ は正則か.
3. $A = \begin{pmatrix} k & 2 \\ 3 & k+1 \end{pmatrix}$ が正則となるような実数 k の条件を求めよ.
4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ に対して, $AB = O$ となる O でない 2 次正方行列 B を 1 つ見つけ, それを使って A が正則でないことを示せ (定理 2 を使わずに).
5. A が正則なとき, 自然数 n について A^n は正則で $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$ であることを示せ.

6. 正方行列 A について, 次を示せ.

- (1) $A^2 = O$ ならば, $E - A$ は正則で $(E - A)^{-1} = E + A$.
- (2) $A^3 = O$ ならば, $E - A$ は正則で $(E - A)^{-1} = E + A + A^2$.

7. 正則行列 A が $A^2 = A$ を満たすならば $A = E$ であることを示せ.

8. 定理 3 の (1), (4) を示せ.

9. (考えてみよう) A, B がどちらも正則でも, $A + B$ は正則とは限らない. そのような例を挙げよ.

■ 練習問題の解答

$$1. 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1 \text{ より } A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

よって $x = 1, y = 1$.

$$2. 2 \cdot 6 - (-4)(-3) = 12 - 12 = 0 \text{ なので正則でない.}$$

$$3. k(k+1) - 2 \cdot 3 = k^2 + k - 6 = (k-2)(k+3). \text{ これが } 0 \text{ でない条件なので } k \neq 2 \text{ かつ } k \neq -3.$$

$$4. \text{ 例えば } B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ とすると } AB = O. \text{ もし } A \text{ が正則なら定理 4 (2) より } B = O \text{ となるが, } B \neq O \text{ なので矛盾. よって } A \text{ は正則でない.}$$

$$5. X = (A^{-1})^n \text{ とおく. } A^n X = A \cdots A A^{-1} \cdots A^{-1} \text{ で, 真ん中の } AA^{-1} = E \text{ から順に消えていき } E \text{ になる. } X A^n = E \text{ も同様. (厳密には } n \text{ に関する帰納法: } A^{n+1}(A^{-1})^{n+1} = A^n(AA^{-1})(A^{-1})^n = A^n(A^{-1})^n = E.)$$

$$6. (1) (E - A)(E + A) = E + A - A - A^2 = E - A^2 = E. (E + A)(E - A) = E - A^2 = E \text{ も同様.}$$

$$(2) (E - A)(E + A + A^2) = E + A + A^2 - A - A^2 - A^3 = E - A^3 = E. \text{ 逆向きも同様.}$$

$$\text{※ 数の } \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots \text{ と同じ形をしている.}$$

$$7. A^2 = A \text{ の両辺に左から } A^{-1} \text{ を掛けると } A^{-1}AA = A^{-1}A, \text{ つまり } A = E.$$

$$8. (1) A^{-1}A = AA^{-1} = E \text{ は, 「} A \text{ が } A^{-1} \text{ の逆行列である」 ことも表している. よって } (A^{-1})^{-1} = A.$$

$$(4) (cA)(c^{-1}A^{-1}) = (cc^{-1})AA^{-1} = E, (c^{-1}A^{-1})(cA) = E \text{ も同様.}$$

$$9. \text{ 例えば } A = E, B = -E. \text{ どちらも正則 } (E^{-1} = E, (-E)^{-1} = -E) \text{ だが, } A + B = O \text{ は正則でない.}$$