

大学数学のアトリエ | 線形代数 第2章 連立一次方程式

No.1 掃き出し法

この回のゴール

- 連立一次方程式を拡大係数行列で表せる.
- 行基本変形で解が変わらない理由を説明できる.
- 掃き出し法で, 解が1つ・無数・なしのどの場合も解を求められる (判定できる).

■ 1. 加減法を行列で書く

高校までの加減法で, 次の連立方程式を解いてみよう.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 & \cdots \text{①} \\ 2x + 3y - z = 5 & \cdots \text{②} \\ x - y + 2z = 5 & \cdots \text{③} \end{cases}$$

「② から ① $\times 2$ を引く」「③ から ① を引く」 $\cdots$ と式どうしを足し引きして文字を消していく. このとき実際に動いているのは**係数と右辺の数**だけで, x, y, z という文字は位置を示す目印にすぎない. そこで数だけを並べて計算する.

定義 1 係数行列・拡大係数行列

m 本の式, n 個の未知数 $x_1, \dots, x_n$ からなる連立一次方程式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

に対し, $A = (a_{ij})$ を**係数行列**, A の右に右辺の列ベクトル $\mathbf{b}$ を並べた $m \times (n+1)$ 行列

$$(A | \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

を**拡大係数行列**という. 方程式は $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ と書ける.

■ 2. 行基本変形で解は変わらない

定理 1

拡大係数行列 $(A | \mathbf{b})$ に行基本変形を行って $(A' | \mathbf{b}')$ になったとする。このとき、方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ と $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ の解はまったく同じである。

【証明】 行った変形に対応する基本行列の積を P とすると、 $A' = PA$, $\mathbf{b}' = P\mathbf{b}$ で、 P は正則である。 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ なら、左から P を掛けて $PA\mathbf{x} = P\mathbf{b}$, つまり $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$. 逆に $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ なら、左から P^{-1} を掛けて $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. $\square$

ポイントは「どの変形も元に戻せる」ことである。戻せるから、変形の前後で「解である」という性質が行きも帰りも保たれる。(もし式を 0 倍すると戻せなくなり、解が増えてしまう。)

■ 3. 掃き出し法

掃き出し法の手順

1. 拡大係数行列 $(A | \mathbf{b})$ を作る。
2. 行基本変形で、左の A の部分が簡約階段行列になるまで変形する (第1章 No.4 の手順)。
3. できあがった行列を方程式に戻して、解を読み取る。

例題 1 解がただ 1 つ

第1節の連立方程式を掃き出し法で解け。

【解答】

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \end{array} \right) &\xrightarrow{\textcircled{2}-\textcircled{1} \times 2, \textcircled{3}-\textcircled{1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -3 & -7 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\textcircled{1}-\textcircled{2}, \textcircled{3}+\textcircled{2} \times 2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & 13 \\ 0 & 1 & -3 & -7 \\ 0 & 0 & -5 & -15 \end{array} \right) \xrightarrow{\textcircled{3} \times (-\frac{1}{5})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & 13 \\ 0 & 1 & -3 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\textcircled{1}-\textcircled{3} \times 4, \textcircled{2}+\textcircled{3} \times 3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right). \end{aligned}$$

方程式に戻すと $x = 1, y = 2, z = 3$.

例題 2 解が無数にある

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 2x + 4y + 3z = 7 \\ x + 2y + 2z = 4 \end{cases} \quad \text{を解け.}$$

【解答】

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\textcircled{2}-\textcircled{1} \times 2, \textcircled{3}-\textcircled{1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\textcircled{1}-\textcircled{2}, \textcircled{3}-\textcircled{2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

方程式に戻すと

$$x + 2y = 2, \quad z = 1, \quad 0 = 0.$$

第3式はいつでも成り立つので、条件は最初の2つだけ。 y は自由を選ぶので $y = t$ (t は任意の実数) とおくと、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2t \\ t \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (t \text{ は任意の実数}).$$

どの文字を自由にするか

簡約階段行列で**主成分がある列**の未知数(例題2では x, z)は、他の未知数で表される。**主成分がない列**の未知数(例題2では y)を自由を選ぶ文字(パラメータ)にする。これに従うと、解の表し方がいつも機械的に決まる。

コラム：解を図形で見る

例題2の解は、点 $(2, 0, 1)$ を通り、方向ベクトル $(-2, 1, 0)$ をもつ**直線**である。3本の平面はどれも異なるが、第2式は第1式と第3式を足したものになっている($(x+2y+z)+(x+2y+2z) = 2x+4y+3z$, $3+4=7$)。1本の方程式が残り2本から導かれるので、独立な条件は2つしかない。そのため、3枚の平面の共通部分として直線が残る。例題1では3枚の平面が1点で交わっている。

例題3 解がない

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 4z = 4 \end{cases} \quad \text{を解け.}$$

【解答】

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\textcircled{2}-\textcircled{1}, \textcircled{3}-\textcircled{1} \times 2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\textcircled{3}-\textcircled{2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

第3行は $0x + 0y + 0z = 1$, つまり $0 = 1$ を表す。これはどんな x, y, z でも成り立たないので、**解なし**。

注意

左側がすべて0で右側が0でない行 $(0 \cdots 0 \mid c)$ ($c \neq 0$) が現れたら、その時点で解なしと判定してよい。最後まで簡約する必要はない。

■ 練習問題

1. 次の連立方程式を掃き出し法で解け.

$$(1) \begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x - y + 2z = 5 \\ 3x + 2y + z = 5 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x - 2y + 5z = 4 \\ 3x - 3y + 7z = 5 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ 2x + 3y + 5z = 8 \\ x + 2y + 3z = 4 \end{cases}$$

2. 次の連立方程式を解け (未知数が4個, 式が3本).

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + 4x_4 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 4 \end{cases}$$

3. 例題2の解 $\begin{pmatrix} 2-2t \\ t \\ 1 \end{pmatrix}$ が, どんな t に対しても元の3本の式を満たすことを, 代入して確かめよ.

4. (考えてみよう) 定理1の証明では「基本行列が正則であること」を使った. もし「ある式を0倍する」という操作を許すと, 解が変わってしまうことがある. 具体例を作って説明せよ.

■ 練習問題の解答

1. (1)

$$\begin{aligned}
\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 \end{array}\right) &\xrightarrow{\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{\textcircled{2} - \textcircled{1} \times 2, \textcircled{3} - \textcircled{1} \times 3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & -5 & -8 \\ 0 & 5 & -5 & -10 \end{array}\right) \\
&\xrightarrow{\textcircled{3} \times \frac{1}{5}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & -5 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{\textcircled{2} \leftrightarrow \textcircled{3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -5 & -8 \end{array}\right) \\
&\xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}, \textcircled{3} - \textcircled{2} \times 3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{\textcircled{3} \times (-\frac{1}{2})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \\
&\xrightarrow{\textcircled{1} - \textcircled{3}, \textcircled{2} + \textcircled{3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right).
\end{aligned}$$

$$x = 2, y = -1, z = 1.$$

(2)

$$\xrightarrow{\textcircled{2} - \textcircled{1} \times 2, \textcircled{3} - \textcircled{1} \times 3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{\textcircled{1} - \textcircled{2} \times 2, \textcircled{3} - \textcircled{2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

$$x - y = -3, z = 2. \text{ 主成分のない列は } y \text{ なので } y = t \text{ とおくと } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (t \text{ は任意}).$$

(3)

$$\xrightarrow{\textcircled{2} - \textcircled{1} \times 2, \textcircled{3} - \textcircled{1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\textcircled{3} - \textcircled{2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right).$$

第3行が $0 = -1$ を表すので解なし.

2.

$$\begin{aligned}
\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 0 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right) &\xrightarrow{\textcircled{2} - \textcircled{1} \times 2, \textcircled{3} - \textcircled{1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \end{array}\right) \\
&\xrightarrow{\textcircled{3} - \textcircled{2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\textcircled{2} \times \frac{1}{2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\
&\xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).
\end{aligned}$$

主成分は第1列と第3列. 主成分のない x_2, x_4 を $x_2 = s, x_4 = t$ とおくと, $x_1 = 3 - 2s - 2t$, $x_3 = 1 - t$.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (s, t \text{ は任意の実数}).$$

3. $(2 - 2t) + 2t + 1 = 3, 2(2 - 2t) + 4t + 3 = 7, (2 - 2t) + 2t + 2 = 4$. どれも t によらず成り立つ.

4. 例えば $\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$ の解は $x = y = 1$ だけである. 第2式を0倍すると $\begin{cases} x + y = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$ となり,
 $x = 2, y = 0$ など解になってしまう. 0倍は元に戻せない(逆の変形がない)ので, 解が増えてしまう.