

No.1 行列式の定義


この回のゴール

- 2 次の行列式 $ad - bc$ が「面積」を表すことを説明できる.
- 置換と、その符号 $\text{sgn } \sigma$ を転倒数から求められる.
- n 次の行列式の定義を読み、2 次・3 次の公式（サラスの方法）がそこから出てくることを確かめられる.
- 三角行列の行列式が対角成分の積であることを示せる.

■ 1. 2 次の行列式と面積

第1章 No.3 で、 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ が正則になる条件は $ad - bc \neq 0$ だった. この $ad - bc$ を A の行列式といい、 $\det A$ や $|A|$ と書く.

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$



A の2本の列ベクトル $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ が作る平行四辺形の面積は $|ad - bc|$ である（高校で学んだ公式 $\frac{1}{2}|ad - bc|$ は三角形の面積）.

符号まで含めると、 $\mathbf{a}_1$ から $\mathbf{a}_2$ へ反時計回りに回るとき $ad - bc > 0$, 時計回りのとき $ad - bc < 0$ になる. 行列式は「向きつきの面積」である.

コラム：なぜ $ad - bc = 0$ だと正則でないのか

$ad - bc = 0$ は、平行四辺形がつぶれて面積0, つまり $\mathbf{a}_1$ と $\mathbf{a}_2$ が同じ直線上に並んでいることを意味する. 行列 A を「平面上の点を動かす変換」と見ると、平面全体が1本の直線に押しつぶされてしまい、元に戻せない. これが「逆行列がない」ことの図形的な意味である. 3 次の行列式は、同じように3本の列ベクトルが作る平行六面体の（向きつきの）体積を表す.

n 次の行列式を定義するために、まず「置換」を準備する.

■ 2. 置換とその符号

定義 1 置換

$\{1, 2, \dots, n\}$ から自分自身への全単射 (1 から n を並べ替える操作) を n 次の置換という. 置換 σ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

のように, 上の段の数が下の段の数に移ることで表す. n 次の置換全体の集合を S_n と書く. S_n の要素の個数は $n!$ である.

例 1

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ は $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$ を表す. 何も動かさない置換 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ を恒等置換といい, ε と書く. 2つの数だけを入れ替え, 他は動かさない置換を互換という.

置換の「符号」は, 並べ替えの結果がどれくらい「乱れているか」の偶奇で決める.

定義 2 転倒数と符号

置換 σ の下の段 $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ を見て, $i < j$ なのに $\sigma(i) > \sigma(j)$ となっている組 (i, j) (大小が逆転している組) の個数を σ の転倒数といい, $N(\sigma)$ と書く.

$$\operatorname{sgn} \sigma = (-1)^{N(\sigma)}$$

を σ の符号という. $\operatorname{sgn} \sigma = 1$ の置換を偶置換, $\operatorname{sgn} \sigma = -1$ の置換を奇置換という.

例 2 S_3 の置換と符号

下の段だけを書く.

下の段	1 2 3	1 3 2	2 1 3	2 3 1	3 1 2	3 2 1
転倒数	0	1	1	2	2	3
符号	+1	-1	-1	+1	+1	-1

たとえば 231 では, 逆転している組は「2 と 1」「3 と 1」の 2 つなので転倒数は 2.

符号について, 次の事実を使う (証明は教科書に任せる).

定理 1 符号の性質

- (1) 置換 σ の下の段で, 2つの数を入れ替え, 符号は逆になる.
- (2) どんな置換もいくつかの互換の積で表せる. k 個の互換の積で表せるなら $\operatorname{sgn} \sigma = (-1)^k$.
- (3) $\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn} \sigma \cdot \operatorname{sgn} \tau$, $\operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn} \sigma$.

注意

(1) の感覚：隣どうしを入れ替えると、その2つの大小関係だけが変わるので転倒数はちょうど1増えるか減る。離れた2つの入れ替えは、隣どうしの入れ替えの奇数回の組合せで実現できる。

■ 3. 行列式の定義

定義 3 行列式

n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ に対し、

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \, a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

を A の行列式という。 $|A|$ とも書く。

定義の読み方

- 1つの項 $a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ は、各行から1つずつ、しかも列が重ならないように成分を選んで掛けたもの。(チェス盤に、互いに取り合わないように飛車を n 個置くイメージ。)
- そういう選び方が $n!$ 通りあり、それぞれに符号 $\operatorname{sgn} \sigma$ を付けて全部足す。
- 4次なら24項、5次なら120項。定義どおりに計算するのは大変なので、実際の計算はNo.2・No.3の方法を使う。

■2次の場合 S_2 は $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (符号 $+1$) と $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ (符号 -1) の2つなので、

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$


第1節の $ad - bc$ と一致する。

■3次の場合 (サラスの方法) 例2の表を使うと

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

これを並べ替えると、次のサラスの方法になる。

右に第1列・第2列を書き足して、斜めに3つずつ掛ける。



$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

注意

サラスの方法は **3次専用**である。4次の行列で同じように斜めの線を引いても、24項のうち8項しか出てこないのが正しくない。

例題 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix} \text{ の行列式を求めよ.}$$

【解答】 サラスの方法で

$$\det A = 1 \cdot 5 \cdot 10 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 - 3 \cdot 5 \cdot 7 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 10 = 50 + 84 + 96 - 105 - 48 - 80 = -3.$$

■ 4. 三角行列の行列式

対角成分より下（または上）がすべて 0 の正方行列を、**上三角行列**（**下三角行列**）という。

定理 2 三角行列の行列式

上三角行列，下三角行列の行列式は，対角成分の積に等しい。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

特に $\det E = 1$.

【証明】 上三角行列で示す。項 $a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ が 0 でないためには，各 i で $a_{i\sigma(i)} \neq 0$ ，つまり $\sigma(i) \geq i$ でなければならない（対角より下は 0）。

$\sigma(n) \geq n$ より $\sigma(n) = n$ 。すると $\sigma(n-1)$ は n 以外で $n-1$ 以上なので $\sigma(n-1) = n-1$ 。これを続けると $\sigma(i) = i$ （すべての i ），つまり $\sigma = \varepsilon$ 。よって残る項は $\operatorname{sgn} \varepsilon \cdot a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ だけ。下三角行列も同様。□

例 3

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot 4 = -24.$$

4 次でも，三角行列なら一瞬で計算できる。次回 No.2 では，行基本変形を使って**どんな行列も三角行列に持ち込んで**行列式を計算する。

■ 練習問題

1. 次の置換の転倒数と符号を求めよ（下の段だけを書いている）.

$$(1) 2413 \quad (2) 3142 \quad (3) 4321 \quad (4) 54321$$

2. 次の行列式を求めよ.

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix} \quad (3) \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & -3 & 0 \\ 1 & 7 & 4 \end{vmatrix}$$

$$3. \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \text{ を満たす } x \text{ を求めよ.}$$

4. 4 次の行列式の定義に現れる項 $a_{12} a_{23} a_{34} a_{41}$ の符号は + か - か. また, $a_{13} a_{21} a_{34} a_{42}$ の符号はどうか.

5. 定義を使って, ある行の成分がすべて 0 である正方行列の行列式は 0 であることを示せ.

6. (考えてみよう) 2 つのベクトル $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ が作る平行四辺形の面積を, 行列式を使って求めよ. また, $\mathbf{a}_1$ と $\mathbf{a}_2$ の順番を入れ替えると行列式はどうなるか.

■ 練習問題の解答

- (1) 逆転している組は $(2, 1)$, $(4, 1)$, $(4, 3)$ の3つ. 転倒数 3, 符号 -1 . (2) $(3, 1)$, $(3, 2)$, $(4, 2)$ の3つ. 転倒数 3, 符号 -1 . (3) どの2つも逆転していて $\binom{4}{2} = 6$. 符号 $+1$. (4) 同様に $\binom{5}{2} = 10$. 符号 $+1$.
- (1) $3 \cdot 4 - (-2) \cdot 5 = 22$. (2) サラスの方法で $2 \cdot 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 \cdot 4 + 3 \cdot 1 \cdot 1 - 3 \cdot 0 \cdot 4 - 2 \cdot 2 \cdot 1 - (-1) \cdot 1 \cdot (-1) = 0 - 8 + 3 - 0 - 4 - 1 = -10$. (3) 下三角行列なので $2 \cdot (-3) \cdot 4 = -24$.
- サラスの方法で $x^3 + 1 + 1 - x - x - x = x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$. よって $x = 1, -2$.
- $a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}$ は $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 4, \sigma(4) = 1$, 下の段 2341. 逆転は $(2, 1)$, $(3, 1)$, $(4, 1)$ の3つで, 符号は $-$.
 $a_{13}a_{21}a_{34}a_{42}$ は下の段 3142 で, 練習問題 1 (2) より符号は $-$.
- 第 i 行がすべて 0 とする. 定義のどの項 $a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ も第 i 行の成分 $a_{i\sigma(i)} = 0$ を1つ含むので 0. よって和も 0.
- $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 1 = 5$ なので, 面積は 5. 入れ替えると $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 6 = -5$ で, 符号だけが変わる (回る向きが逆になる). (第1節の図はこの2本のベクトルで描いてある.)