

No.2 行列式の性質

この回のゴール

- 行基本変形によって行列式がどう変わるかを説明でき、その理由を定義から示せる。
- 行基本変形で三角行列に持ち込んで、行列式を計算できる。
- $\det {}^tA = \det A$, $\det(AB) = \det A \det B$ を使える。
- 「 A が正則 $\iff \det A \neq 0$ 」を説明できる。

■ 1. 行に関する性質

以下、 A を n 次正方行列とし、第 i 行を $\mathbf{a}_i$ (行ベクトル) として $\det A = \det \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{pmatrix}$ のように書く。

定理 1 行に関する性質

- (1) (多重線形性) 1つの行について、和は分けられ、定数倍はくくり出せる。

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{b} + \mathbf{c} \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{b} \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{c} \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} \vdots \\ k\mathbf{b} \\ \vdots \end{pmatrix} = k \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{b} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

($\vdots$ の部分の行はすべて共通)。

- (2) (交代性) 2つの行を入れ替えると、行列式は -1 倍になる。
 (3) 2つの行が等しい行列の行列式は 0 。
 (4) ある行に別の行の定数倍を加えても、行列式は変わらない。
 (5) ある行がすべて 0 なら、行列式は 0 。

【証明】 (1) 定義の各項 $\operatorname{sgn} \sigma a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ は、第 i 行の成分をちょうど 1 つ含む。その成分が $b_{\sigma(i)} + c_{\sigma(i)}$ なら項は 2 つに分かれ、 $k b_{\sigma(i)}$ なら k がくくり出せる。

(2) 第 i 行と第 j 行 ($i < j$) を入れ替えた行列を B とすると、

$$\det B = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdots a_{j\sigma(i)} \cdots a_{i\sigma(j)} \cdots$$

ここで σ の下の段の $\sigma(i)$ と $\sigma(j)$ を入れ替えた置換を τ とすると、この項は $\operatorname{sgn} \sigma a_{1\tau(1)} \cdots a_{n\tau(n)}$ に等しく、No.1 定理 1 (1) より $\operatorname{sgn} \tau = -\operatorname{sgn} \sigma$ 。 σ が S_n 全体を動くとき τ も S_n 全体をちょうど 1 回ずつ動くので、 $\det B = -\det A$ 。

(3) 等しい 2 行を入れ替えても行列は変わらないが、(2) より行列式は -1 倍になる。よって $\det A = -\det A$ 、つまり $\det A = 0$ 。

(4) 第 i 行に第 j 行の k 倍を加えると, (1) より

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{a}_i + k\mathbf{a}_j \\ \vdots \\ \mathbf{a}_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \det A + k \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{a}_j \\ \vdots \\ \mathbf{a}_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \det A + k \cdot 0 = \det A.$$

(2 つめの行列は第 i 行と第 j 行が等しいので, (3) より 0.)

(5) No.1 練習問題 5 で示した. □

行基本変形と行列式のまとめ

行基本変形	行列式の変化
(I) 2 つの行を入れ替える	-1 倍
(II) ある行を c 倍する	c 倍
(III) ある行に別の行の c 倍を加える	変わらない

計算では, (III) を中心に使う三角行列にするのが基本. (II) は逆向きに「ある行の共通因数をくくり出す」形でよく使う.

■ 2. 列についても同じことが言える

定理 2 転置

$$\det {}^t A = \det A.$$

【証明】 ${}^t A$ の (i, j) 成分は a_{ji} なので $\det {}^t A = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn} \sigma a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}$. 各項の積を行番号の順に並べ直すと, $a_{\sigma(k)k}$ は $i = \sigma(k)$, $k = \sigma^{-1}(i)$ として $a_{1\sigma^{-1}(1)} \cdots a_{n\sigma^{-1}(n)}$ になる. No.1 定理 1 (3) より $\operatorname{sgn} \sigma = \operatorname{sgn} \sigma^{-1}$ であり, σ が S_n 全体を動くとき σ^{-1} も S_n 全体を動く. よって $\det {}^t A = \sum_{\rho} \operatorname{sgn} \rho a_{1\rho(1)} \cdots a_{n\rho(n)} = \det A$. □

転置すると行と列が入れ替わるので, 定理 1 は「行」を「列」に読みかえてもすべて成り立つ. 行列式の計算では, 行の変形と列の変形を混せて使ってよい.

注意

逆行列の計算 (第 1 章 No.4) や連立方程式の掃き出し (第 2 章) では, 列の変形を混せてはいけなかった. 行列式の計算では, 各変形で行列式がどう変わるかさえ追いかければ, 行・列どちらの変形を使ってもよい.

■ 3. 行列式の計算

例題 1

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \text{ を求めよ.}$$

【解答】 (III) の変形だけを使って上三角行列にする (行列式は変わらない).

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{②}-\text{①} \times 2, \text{③}+\text{①}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{③}+\text{②} \times 2, \text{④}+\text{②}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{④}-\text{③} \times \frac{1}{2}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot 4 \cdot 2 = -8.$$

例題 2

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} \text{ を因数分解した形で求めよ.}$$

【解答】 第1行に第2行と第3行を加えると (行列式は変わらない), 第1行がすべて $a+2b$ になる. それをくくり出す.

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+2b & a+2b & a+2b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}.$$

さらに ② - ① $\times b$, ③ - ① $\times b$ とすると

$$(a+2b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a+2b)(a-b)^2.$$

注意

- 文字を含む行列式は, サラスの方法で展開してから因数分解するより, **変形しながら共通因数をくくり出す**ほうが楽なことが多い.
- 「全部の行 (列) を足すと同じ数が並ぶ」は, よく使う工夫である.

■ 4. 正則性と積の行列式

定理 3 正則性の判定

n 次正方行列 A について,

$$A \text{ が正則} \iff \det A \neq 0.$$

【証明】 A を行基本変形で簡約階段行列 R にする. 定理 1 より, 各変形で行列式は -1 倍・ c 倍 ($c \neq 0$)・そのまま, のどれかになるので, $\det R = k \det A$ ($k \neq 0$) の形になる. したがって $\det A \neq 0 \iff \det R \neq 0$.

第 1 章 No.5 定理 2 より, A が正則なら $R = E$ で $\det R = 1 \neq 0$. 正則でないなら R の最後の行は零行で, 定理 1 (5) より $\det R = 0$. □

定理 4 積の行列式

n 次正方行列 A, B について

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

特に A が正則なら $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

【証明】 基本行列の場合: $\det P(i, j) = -1$, $\det Q(i; c) = c$, $\det R(i, j; c) = 1$ である (E に 1 回変形したものだから). PB は B に行基本変形をしたものなので, 定理 1 から $\det(PB) = \det P \cdot \det B$ が成り立つ.

A が正則の場合: $A = P_1 P_2 \cdots P_k$ (基本行列の積, 第 1 章 No.5 定理 3) と書けるので, 上の結果をくり返し使って

$$\det(AB) = \det P_1 \cdots \det P_k \det B, \quad \det A = \det P_1 \cdots \det P_k.$$

よって $\det(AB) = \det A \det B$.

A が正則でない場合: AB も正則でない (もし AB が正則なら $A(B(AB)^{-1}) = E$ となり, 第 2 章 No.3 練習問題 5 より A は正則になってしまう). 定理 3 より両辺とも 0.

最後の主張は, $AA^{-1} = E$ の両辺の行列式をとって $\det A \det(A^{-1}) = 1$. □

コラム: 面積の拡大率として見ると

行列で平面を変換したとき, 図形の面積 (3 次なら体積) は $|\det A|$ 倍になる. 符号まで含めた $\det A$ は向きつき面積の倍率で, $\det A < 0$ のときは図形が裏返る (向きが逆になる). B で変換してから A で変換すれば, 向きつき面積は $\det B$ 倍してから $\det A$ 倍される. $\det(AB) = \det A \det B$ はそのことを言っている. 逆に $\det(A+B) = \det A + \det B$ は一般には成り立たないので注意.

■ 練習問題

1. 行基本変形を用いて次の行列式を求めよ.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 7 & 11 \end{vmatrix}$$

2. 3×3 行列 $A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3)$ ($\mathbf{a}_j$ は列ベクトル) について $\det A = 5$ とする. 次の値を求めよ.

$$(1) \det(\mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_3) \quad (2) \det(\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ 3\mathbf{a}_3) \quad (3) \det(\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3) \quad (4) \det(2A)$$

3. n 次正方行列 A と実数 c について, $\det(cA) = c^n \det A$ を示せ.

4. A を n 次正方行列とする. 次を示せ.

- (1) $A^2 = A$ ならば, $\det A = 0$ または $\det A = 1$.
- (2) n が奇数なら, $A^2 = -E$ となる (成分が実数の) A は存在しない.
- (3) P が正則なら, $\det(P^{-1}AP) = \det A$.

5. (考えてみよう) ${}^tA = -A$ を満たす正方行列を交代行列という (第1章 No.1 練習問題8). n が奇数なら, n 次交代行列の行列式は0であることを示せ.

■ 練習問題の解答

1.

$$(与式) \xrightarrow{\text{②}-\text{①} \times 2, \text{③}-\text{①}, \text{④}-\text{①} \times 3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{③} + \text{②}, \text{④} - \text{②}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 = 3.$$

2. 列についての性質（定理2により定理1を列に読みかえたもの）を使う。（1）第1列と第2列の入れ替えなので -5 。（2）第3列が3倍なので 15 。（3）第1列に第2列の2倍を加えただけなので 5 。（4）3つの列がすべて2倍なので $2^3 \cdot 5 = 40$ 。

3. cA は A の n 本の行それぞれを c 倍したもの。定理1 (1) で1行ずつ c をくくり出すと $c^n \det A$ 。

4. (1) 定理4より $(\det A)^2 = \det A$ なので $\det A(\det A - 1) = 0$ 。(2) $A^2 = -E$ なら $(\det A)^2 = \det(-E) = (-1)^n = -1$ (n が奇数)。実数の2乗は負にならないので矛盾。(3) $\det(P^{-1}AP) = \det P^{-1} \det A \det P = \frac{1}{\det P} \det A \det P = \det A$ 。

5. 定理2と練習問題3より $\det A = \det {}^tA = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$ 。よって $\det A = 0$ 。