

No.3 基底と次元

この回のゴール

- 生成系・基底の定義を述べ、与えられた組が基底かどうか判定できる.
- 基底に関する座標を求められる.
- 「基底を構成するベクトルの個数は基底の選び方によらない」理由を説明でき、次元を求められる.
- 1 次独立な組を基底に延長できる.

以下, V をベクトル空間とする.

■ 1. 生成系

定義 1 生成系

V のすべてのベクトルが $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ の 1 次結合で表されるとき, すなわち

$$V = \langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \rangle$$

のとき, $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ は V を生成するといい, $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$ を V の生成系という.

例 1

- (a) $\mathbb{R}^3$ は $\mathbf{e}_1 = {}^t(1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = {}^t(0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = {}^t(0, 0, 1)$ で生成される. ${}^t(x, y, z) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$ だから.
- (b) $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ に ${}^t(1, 1, 1)$ を加えた 4 本も $\mathbb{R}^3$ を生成する. 生成系にベクトルを付け加えても生成系のまま.
- (c) $\mathbb{R}[x]_2$ は $1, x, x^2$ で生成される.

(b) の 4 本は生成系ではあるが, ${}^t(1, 1, 1) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3$ なので余分を含んでいる. 余分がなく, しかも全体を生成するもの, それが基底である.

■ 2. 基底と座標

定義 2 基底

$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ が次の 2 条件を満たすとき, 組 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ を V の基底という.

- (i) $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ は 1 次独立である. (余分がない)
- (ii) $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ は V を生成する. (足りないものがない)

例2 標準的な基底

(a) $\mathbb{R}^n$ の $e_1, \dots, e_n$ (e_i は第 i 成分だけ 1, 他は 0). 標準基底という.

(b) $\mathbb{R}[x]_n$ の $1, x, x^2, \dots, x^n$.

(c) $M_{2,2}(\mathbb{R})$ の $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

どれも 1 次独立で生成系であることは, 成分 (係数) を比べればすぐ分かる.

基底を 1 つ決めると, 各ベクトルを数の組で表せる.

定理1 座標

$(v_1, \dots, v_n)$ が V の基底なら, V のどのベクトル x も

$$x = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \cdots + x_n v_n$$

とただ 1 通りに表される. この ${}^t(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ を, 基底 $(v_1, \dots, v_n)$ に関する x の座標 (成分) という.

【証明】生成系なので表せる. 1 次独立なので表し方は 1 通り (No.2 定理 2). □

注意

基底は「順番つきの組」として扱う. (v_1, v_2) と (v_2, v_1) では座標の並び順が変わるからである.

例題1

$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ は $\mathbb{R}^3$ の基底であることを示し, $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ のこの基底に関する座標を求めよ.

【解答】 $P = (v_1 \ v_2 \ v_3)$ とおくと $\det P = 1 \neq 0$ (第1章 No.4 例題2の行列) なので, No.2 定理5より1次独立. また, 正則なので任意の $x \in \mathbb{R}^3$ に対して $Pc = x$ は解 $c = P^{-1}x$ をもち, 生成系でもある. よって基底.

座標は $Pc = b$ の解. 第1章 No.4 で求めた P^{-1} を使って

$$c = P^{-1}b = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -7 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

つまり $b = 12v_1 - 7v_2 + 4v_3$.

定理2 $\mathbb{R}^n$ の基底の判定

$v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ (ちょうど n 本) について,

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ が } \mathbb{R}^n \text{ の基底} \iff \det(v_1 \ \cdots \ v_n) \neq 0.$$

【証明】 $P = (v_1 \ \cdots \ v_n)$ が正則なら, 例題1と同様に1次独立かつ生成系. 逆に基底なら1次独立なので, No.2 定理5 (2) より $\det P \neq 0$. □

例題 2

$\mathbb{R}[x]_2$ の基底 $(1, x-1, (x-1)^2)$ に関する $f(x) = x^2 + 3x + 5$ の座標を求めよ.

【解答】 $t = x - 1$ とおくと $x = t + 1$ なので

$$f = (t+1)^2 + 3(t+1) + 5 = t^2 + 5t + 9 = 9 \cdot 1 + 5(x-1) + 1 \cdot (x-1)^2.$$

座標は ${}^t(9, 5, 1)$. $(1, x-1, (x-1)^2)$ が基底であることは練習問題 3 と同様に示せる.)

コラム：テイラー展開の予告

例題 2 の座標 $9, 5, 1$ は, $f(1) = 9, f'(1) = 5, \frac{f''(1)}{2!} = 1$ になっている. 「基底 $1, (x-a), (x-a)^2, \dots$ に関する座標」がテイラー展開の係数である (分野「微分積分」第 1 章 No.5).

■ 3. 基底の個数は一定である

基底は 1 通りではない. しかし, **基底に含まれるベクトルの個数はいつも同じであることを示そう**. 鍵になるのは次の定理である.

定理 3 基本定理

V が m 本のベクトル $v_1, \dots, v_m$ で生成されるならば, V の $m+1$ 本以上のベクトルは必ず 1 次従属である.

【証明】 $w_1, \dots, w_k \in V$ ($k > m$) とする. 各 w_j は v_i の 1 次結合なので

$$w_j = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \dots + a_{mj}v_m = \sum_{i=1}^m a_{ij}v_i \quad (j = 1, \dots, k)$$

と書ける. 係数を並べた $m \times k$ 行列を $A = (a_{ij})$ とする. $k > m$ なので, 同次方程式 $Ac = 0$ は自明でない解 $c = {}^t(c_1, \dots, c_k)$ をもつ (第 2 章 No.3 定理 2). このとき

$$\sum_{j=1}^k c_j w_j = \sum_{j=1}^k c_j \sum_{i=1}^m a_{ij} v_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^k a_{ij} c_j \right) v_i = \sum_{i=1}^m 0 \cdot v_i = 0.$$

($\sum_j a_{ij} c_j$ は Ac の第 i 成分で 0.) $c \neq 0$ なので, これは $w_1, \dots, w_k$ の自明でない 1 次関係である. $\square$

注意

この証明では, 抽象的なベクトル空間の問題を, 係数の行列 A を通して**連立方程式の問題**に置き換えている. 第 2 章で学んだことが, ここで本質的に効いている.

定理 4 基底の個数

V の 2 つの基底 $(v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_m)$ について, $n = m$.

【証明】 $v_1, \dots, v_n$ は V を生成し, $w_1, \dots, w_m$ は 1 次独立なので, 定理 3 より $m \leq n$. 役割を入れ替えれば $n \leq m$. よって $n = m$. $\square$

定義 3 次元

V が n 本のベクトルからなる基底をもつとき、 n を V の**次元**といい、 $\dim V = n$ と書く．零ベクトルだけからなる空間 $\{0\}$ の次元は 0 と約束する．有限個のベクトルからなる基底をもつ空間を**有限次元**，そうでない空間を**無限次元**という．

例 3

$$\dim \mathbb{R}^n = n, \quad \dim \mathbb{R}[x]_n = n + 1, \quad \dim M_{m,n}(\mathbb{R}) = mn.$$

$\mathbb{R}[x]_n$ は $x^0 = 1$ を含むので $n + 1$ になることに注意．多項式全体 $\mathbb{R}[x]$ や関数の空間 $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ は無限次元である（練習問題 6）．

コラム：次元は「自由度」

「次元」は、ベクトルを決めるのに必要な**実数の個数**である．直線は 1 個、平面は 2 個、空間は 3 個の数で位置が決まる． $\mathbb{R}[x]_2$ の多項式は係数 3 個で決まるので 3 次元．第 2 章 No.2 で見た「解の自由度」も、No.4 で解空間の次元として理解できる．

4. 基底の作り方**定理 5**

$\dim V = n$ とする．

- (1) V の n 本の 1 次独立なベクトルは、 V の基底である．
- (2) V を生成する n 本のベクトルは、 V の基底である．
- (3) **(基底の延長)** V の 1 次独立なベクトル $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ ($k < n$) に、いくつかのベクトルを付け加えて V の基底にできる．

【証明】 (1) $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ が 1 次独立で、 V を生成しないとすると、すると $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \rangle$ に入らない $\mathbf{b} \in V$ があり、No.2 定理 3 より $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b}$ は 1 次独立．しかし V は n 本の基底で生成されるので、定理 3 より $n + 1$ 本は 1 次従属．矛盾．

(3) $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \rangle \neq V$ なら、そこに入らない $\mathbf{a}_{k+1}$ を付け加える．No.2 定理 3 より 1 次独立のまま．これをくり返すと、定理 3 より 1 次独立なベクトルは n 本を超えられないので、ちょうど n 本になったところで止まる．(1) よりそれは基底．

(2) 生成系 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ が 1 次従属なら、No.2 定理 1 より他の 1 次結合で書ける 1 本を除いても生成系のまま．これをくり返すと、1 次独立な生成系（基底）が n 本未満で得られてしまい、定理 4 に反する．よって初めから 1 次独立で、基底．□

注意

$\dim V = n$ が分かっているならば、 n 本の組が基底かどうかは「1 次独立」か「生成系」の**どちらか片方**を確かめれば十分である． $\mathbb{R}^n$ では、 n 本を並べた行列の行列式が 0 でないかを見ればよい（定理 2）．

例題 3

$\mathbf{a}_1 = {}^t(1, 1, 0)$, $\mathbf{a}_2 = {}^t(0, 1, 1)$ に 1 本付け加えて, $\mathbb{R}^3$ の基底を作れ.

【解答】 標準基底の中から, $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle$ に入らないものを探し, $\mathbf{e}_1$ を付け加えると

$$\det(\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{e}_1) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

よって $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{e}_1)$ は $\mathbb{R}^3$ の基底. ($\mathbf{e}_3$ を付け加えても基底になる. 付け加え方は 1 通りではない.)

■ 練習問題

- $\mathbf{v}_1 = {}^t(1, 0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = {}^t(1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_3 = {}^t(0, 1, 1)$ は $\mathbb{R}^3$ の基底であることを示し, $\mathbf{b} = {}^t(2, 3, 5)$ のこの基底に関する座標を求めよ.
- 次の組は $\mathbb{R}^3$ の基底か.
 - ${}^t(1, 2, 3)$, ${}^t(4, 5, 6)$, ${}^t(7, 8, 9)$
 - ${}^t(1, 0, 0)$, ${}^t(1, 1, 0)$
 - ${}^t(1, 0, 0)$, ${}^t(1, 1, 0)$, ${}^t(1, 1, 1)$, ${}^t(0, 0, 1)$
- $1, 1+x, 1+x+x^2$ は $\mathbb{R}[x]_2$ の基底であることを示し, $f(x) = 3-x+2x^2$ の座標を求めよ.
- $\mathbf{a} = {}^t(1, 2, -1)$ に 2 本付け加えて $\mathbb{R}^3$ の基底を作れ.
- 次の空間の次元を答えよ.
 - $\mathbb{R}[x]_3$
 - $M_{2,3}(\mathbb{R})$
 - $\mathbb{R}^5$
- (考えてみよう) 多項式全体 $\mathbb{R}[x]$ が無限次元であることを示せ. (ヒント: $\dim \mathbb{R}[x] = n$ と仮定して, $1, x, \dots, x^n$ を考える.)

■ 練習問題の解答

- $\det(\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3) = 2 \neq 0$ (No.2 練習問題 1 (1)) なので, 定理 2 より基底. $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$ を解くと $c_1 + c_2 = 2$, $c_2 + c_3 = 3$, $c_1 + c_3 = 5$. 3 式を足して $c_1 + c_2 + c_3 = 5$. ここから $c_3 = 3$, $c_1 = 2$, $c_2 = 0$. 座標は ${}^t(2, 0, 3)$.
- (1) 基底でない. 行列式が 0 (第 1 章 No.5 練習問題 2 でランク 2). (2) 基底でない. $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ なので 2 本では生成できない (たとえば $\mathbf{e}_3$ が作れない). (3) 基底でない. 4 本は 1 次従属 (No.2 定理 5 (3)). (生成系ではある.)
- 3 本で $\dim \mathbb{R}[x]_2 = 3$ なので, 1 次独立を示せばよい. $c_1 + c_2(1+x) + c_3(1+x+x^2) = 0$ とすると, x^2 の係数から $c_3 = 0$, x の係数から $c_2 + c_3 = 0$ で $c_2 = 0$, 定数項から $c_1 = 0$.
座標: $a + b(1+x) + c(1+x+x^2) = 3 - x + 2x^2$ とおくと, $c = 2$, $b + c = -1$, $a + b + c = 3$. よって $c = 2$, $b = -3$, $a = 4$. 座標は ${}^t(4, -3, 2)$.

- 例えば $\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ を付け加えると $\det(\mathbf{a} \ \mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ で基底になる.

5. (1) 4 (基底 $1, x, x^2, x^3$). (2) 6. (3) 5.

6. $\dim \mathbb{R}[x] = n$ と仮定する. $1, x, \dots, x^n$ の $n+1$ 本は 1 次独立である ($c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n = 0$ なら, 多項式として 0 なのですからすべての係数が 0). ところが定理 3 より, n 次元の空間の $n+1$ 本は 1 次従属でなければならない. 矛盾. よって $\mathbb{R}[x]$ は有限次元でない.