

No.2 固有方程式

この回のゴール

- 固有多項式・固有方程式を定義し、固有値を求められる.
- 固有値・固有空間を求める手順を実行できる.
- 代数的重複度と幾何的重複度を区別し、その大小関係を説明できる.
- 固有多項式が基底（相似）によらないこと、トレース・行列式と固有値の関係、ケイリー・ハミルトンの定理を使える.

■ 1. 固有方程式

No.1 定理 1 より, λ が A の固有値 $\iff A - \lambda E$ が正則でない $\iff \det(A - \lambda E) = 0$ (第 3 章 No.2 定理 3). これで固有値を**方程式を解いて**求められるようになる.

定義 1 固有多項式・固有方程式

n 次正方行列 A に対して, λ の多項式

$$\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A)$$

を A の**固有多項式** (特性多項式) といい, 方程式 $\varphi_A(\lambda) = 0$ を**固有方程式** (特性方程式) という.

定理 1

λ が A の固有値 $\iff \varphi_A(\lambda) = 0$.

【証明】 $\det(\lambda E - A) = (-1)^n \det(A - \lambda E)$ (第 3 章 No.2 練習問題 3) なので, $\varphi_A(\lambda) = 0 \iff \det(A - \lambda E) = 0$. $\square$

注意

- $\det(A - \lambda E)$ を固有多項式と呼ぶ本もある. 符号が $(-1)^n$ 倍違うだけで, 根 (固有値) は同じ. $\det(\lambda E - A)$ にすると, 最高次の係数が 1 になる ($\lambda^n + \dots$).
- $\varphi_A(\lambda)$ は λ の n 次式なので, 固有値は (重複を含めて) 高々 n 個.

■ 2 次正方行列の場合 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ なら

$$\varphi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A.$$

■ 2. 固有値・固有空間の求め方

手順

1. 固有方程式 $\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = 0$ を解いて、固有値 λ を求める.
2. 各固有値 λ について、同次方程式 $(A - \lambda E)x = \mathbf{0}$ を解き、固有空間 $W(\lambda)$ の基底を求める.

例題 1

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ の固有値と固有空間を求めよ.

【解答】 $\varphi_A(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2)$ より、固有値は 5, 2.

$$\lambda = 5 : A - 5E = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \text{ より } -x_1 + x_2 = 0. \quad W(5) = \langle {}^t(1, 1) \rangle.$$

$$\lambda = 2 : A - 2E = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ より } 2x_1 + x_2 = 0. \quad W(2) = \langle {}^t(1, -2) \rangle.$$

注意

固有値 λ を正しく求めていれば、 $A - \lambda E$ は必ず正則でない (ランクが n より小さい). 簡約して零行が出なかったら、固有値の計算を間違えている.

例題 2

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ の固有値と固有空間を求めよ.

【解答】 第 3 章 No.2 例題 2 と同じ工夫で、第 1 行に第 2・3 行を加えてから $\lambda - 4$ をくくり出す.

$$\varphi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix}.$$

(2 つめの等号は ② + ①, ③ + ①.) よって $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - 4)(\lambda - 1)^2$, 固有値は 4, 1 (1 は 2 重根).

固有空間は No.1 例題 1・例題 2 で求めたとおり

$$W(4) = \langle {}^t(1, 1, 1) \rangle, \quad W(1) = \langle {}^t(-1, 1, 0), {}^t(-1, 0, 1) \rangle.$$

例 1 三角行列

上三角行列 (下三角行列) A の固有値は、対角成分である. $\lambda E - A$ も三角行列なので、 $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$ (第 3 章 No.1 定理 2).

例 2 実数の固有値がない場合

90° 回転 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ の固有多項式は $\lambda^2 + 1$ で、実数の根をもたない (No.1 例 1 (c)). 複素数まで考えれば固有値は $\pm i$ である. 固有値を複素数の範囲で考える立場もあり、第 7 章 No.5 で少し使う.

■ 3. 重複度

定義 2 重複度

固有値 λ_0 について,

- 固有多項式 $\varphi_A(\lambda)$ が $(\lambda - \lambda_0)^m$ で割り切れる最大の m を, λ_0 の**代数的重複度**という.
- 固有空間の次元 $\dim W(\lambda_0)$ を, λ_0 の**幾何的重複度**という.

例 3

- (a) 例題 2 の固有値 1: 代数的重複度 2, 幾何的重複度 2.
- (b) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ の固有値 3: $\varphi_A = (\lambda - 3)^2$ で代数的重複度 2. しかし $W(3) = \langle \mathbf{e}_1 \rangle$ (No.1 練習問題 3) で, 幾何的重複度は 1.

定理 2

各固有値 λ_0 について, $1 \leq (\text{幾何的重複度}) \leq (\text{代数的重複度})$.

【証明】固有値なので $W(\lambda_0) \neq \{\mathbf{0}\}$ で, 左の不等式が成り立つ. $k = \dim W(\lambda_0)$ とし, $W(\lambda_0)$ の基底 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ を $\mathbb{R}^n$ の基底 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ に延長する. $P = (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n)$ とおくと, $A\mathbf{v}_i = \lambda_0\mathbf{v}_i$ ($i \leq k$) より, $P^{-1}AP$ の第 1~ k 列は $\lambda_0\mathbf{e}_1, \dots, \lambda_0\mathbf{e}_k$ である (第 5 章 No.5 定理 3. $P^{-1}AP$ は基底 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ に関する f_A の表現行列). つまり

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_0 E_k & C \\ O & D \end{pmatrix}$$

の形になる. 次の定理 3 より $\varphi_A = \varphi_{P^{-1}AP}$ で, これを第 1 列から順に k 回余因子展開すると $(\lambda - \lambda_0)^k \det(\lambda E - D)$. よって φ_A は $(\lambda - \lambda_0)^k$ で割り切れる. $\square$

No.3 で見るように, 幾何的重複度が代数的重複度より小さい固有値があると, **対角化できない**.

■ 4. 固有多項式の性質

定理 3 相似な行列の固有多項式

$B = P^{-1}AP$ ならば $\varphi_B(\lambda) = \varphi_A(\lambda)$. したがって相似な行列は同じ固有値をもつ.

【証明】 $\lambda E - P^{-1}AP = P^{-1}(\lambda E - A)P$ なので, 第 3 章 No.2 定理 4 より $\det(\lambda E - B) = \det P^{-1} \det(\lambda E - A) \det P = \det(\lambda E - A)$. $\square$

定理 3 より, 線形変換 $f: V \rightarrow V$ の固有多項式を「どれか 1 つの基底に関する表現行列の固有多項式」として, 基底によらずに定めることができる (第 5 章 No.5 定理 4 の「行列式・トレース」と同じ考え方).

定理 4 トレース・行列式と固有値

n 次正方行列 A の固有多項式は

$$\varphi_A(\lambda) = \lambda^n - (\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A$$

の形をしている．特に， $\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$ と 1 次式の積に分解できるとき (λ_i は重複を含む固有値)，

$$\operatorname{tr} A = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n, \quad \det A = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

【証明】 定数項： $\varphi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A$ (第 3 章 No.2 練習問題 3)． λ^{n-1} の係数：行列式の定義の各項のうち λ^{n-1} 以上の次数をもつのは対角成分の積 $(\lambda - a_{11}) \cdots (\lambda - a_{nn})$ だけで (他の項は対角成分を 2 つ以上含まない)，その λ^{n-1} の係数は $-(a_{11} + \cdots + a_{nn})$ ．後半は $(\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n)$ を展開した係数と比べる (解と係数の関係)．□

検算に使える

例題 2 では，固有値 4, 1, 1 の和 6 が $\operatorname{tr} A = 2 + 2 + 2$ に，積 4 が $\det A$ に一致する．固有値を求めたら，和がトレースに等しいかを確認するとよい．

5. ケイリー・ハミルトンの定理**定理 5** ケイリー・ハミルトンの定理

n 次正方行列 A の固有多項式を $\varphi_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$ とすると，

$$\varphi_A(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0E = O.$$

【証明】(2 次の場合) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ について $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$ を示せばよい． $A^2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix}$ ， $(a+d)A = \begin{pmatrix} a^2+ad & ab+bd \\ ac+cd & ad+d^2 \end{pmatrix}$ なので， $A^2 - (a+d)A = \begin{pmatrix} bc-ad & 0 \\ 0 & bc-ad \end{pmatrix} = -(ad-bc)E$ ．□

一般の場合の証明は，余因子行列の公式 $(\lambda E - A)(\widetilde{\lambda E - A}) = \varphi_A(\lambda)E$ (第 3 章 No.3 定理 2) を λ の多項式として比べる方法などがある．ここでは省略する．

注意

「 $\varphi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A)$ に $\lambda = A$ を代入すると $\det(AE - A) = \det O = 0$ 」という議論は誤りである．左辺は行列，右辺は数で，そもそも比べられない．定理は「多項式を作ってから A を代入する」と行列 O になる，という主張である．

例題 3

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ について，ケイリー・ハミルトンの定理を用いて A^{-1} を求めよ．

【解答】 例題 1 より $A^2 - 7A + 10E = O$. $A(7E - A) = 10E$ と変形すると, $A \cdot \frac{1}{10}(7E - A) = E$ なので

$$A^{-1} = \frac{1}{10}(7E - A) = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

■ 練習問題

1. 次の行列の固有値と固有空間を求めよ. また, 各固有値の代数的重複度と幾何的重複度を答えよ.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

2. A と ${}^tA$ の固有多項式は等しいことを示せ.

3. 第 3 章 No.3 練習問題 5 の行列 $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -r & -q & -p \end{pmatrix}$ の固有多項式を答えよ. これを使って, 固有値が 1, 2, 3 となる 3 次正方行列を 1 つ作れ.

4. 練習問題 1 (3) の行列について, 固有値の和と積がそれぞれトレースと行列式に等しいことを確かめよ.

5. $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ について, ケイリー・ハミルトンの定理を用いて A^3 を $pA + qE$ の形で表し, A^3 を求めよ.

6. (考えてみよう) 回転行列 $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) が実数の固有値をもつのはどんなときか. 図形的な意味とともに答えよ.

■ 練習問題の解答

1. (1) $\varphi = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$. $W(3) = \langle {}^t(1, 1) \rangle$, $W(-1) = \langle {}^t(1, -1) \rangle$. どちらも代数的・幾何的重複度は 1.

- (2) $\varphi = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2$. $A - 3E = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ より $W(3) = \langle {}^t(1, 1) \rangle$. 代数的重複度 2, 幾何的重複度 1.

- (3) 第 1 行で展開すると

$$\varphi = \lambda\{(\lambda-2)(\lambda-4)-1\} + \{(\lambda-4)+3\} - \{-1-3(\lambda-2)\} = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3).$$

$$W(1) = \langle {}^t(1, 0, 1) \rangle, W(2) = \langle {}^t(1, 1, 1) \rangle, W(3) = \langle {}^t(1, 1, 2) \rangle. \text{ どれも重複度 1.}$$

2. $\det(\lambda E - {}^tA) = \det {}^t(\lambda E - A) = \det(\lambda E - A)$ (第 3 章 No.2 定理 2).

3. 第 3 章 No.3 練習問題 5 より $\varphi_C(\lambda) = \lambda^3 + p\lambda^2 + q\lambda + r$. $(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$ なので $p = -6$, $q = 11$, $r = -6$ として $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{pmatrix}$.

4. 固有値の和 $1 + 2 + 3 = 6$, $\text{tr} = 0 + 2 + 4 = 6$. 積 $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$, $\det = 6$ (サラスの方法で $0 - 3 - 1 + 6 - 0 + 4 = 6$).
5. $A^2 = 7A - 10E$ なので $A^3 = 7A^2 - 10A = 7(7A - 10E) - 10A = 39A - 70E$. よって $A^3 = \begin{pmatrix} 156 - 70 & 39 \\ 78 & 117 - 70 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 86 & 39 \\ 78 & 47 \end{pmatrix}$.
6. $\varphi = \lambda^2 - 2\cos\theta\lambda + 1$. 判別式 $/4$ は $\cos^2\theta - 1 = -\sin^2\theta$ で, 実数解をもつ $\iff \sin\theta = 0 \iff \theta = 0, \pi$. $\theta = 0$ (何もしない, 固有値 1) と $\theta = \pi$ (180° 回転, 固有値 -1) のときだけ, 向きが変わらない (逆向きになる) 方向がある.