

No.1 集合の定義と演算

この回のゴール

- 集合を外延的記法・内包的記法で書き、「要素である ($\in$)」と「部分集合である ($\subset$)」を区別できる.
- 和集合・共通部分・差集合・補集合を求め、ベン図で表せる.
- ド・モルガンの法則などの演算法則を、「要素を追いかける」方法で証明できる.
- 冪集合と直積を求められる.

■ 1. 集合とは

高校数学でも「集合」は扱ったが、大学の数学では、ほとんどすべての対象（数の集まり、関数の集まり、ベクトル空間、……）が集合の言葉で書かれる。集合論は、大学数学全体の「共通語」を学ぶ分野である。

定義 1 集合と要素

ある範囲に入るか入らないかが**はっきり決まっているものの集まり**を**集合**という。集合 A に入っている 1 つ 1 つのものを A の**要素**（または**元**）という。 x が A の要素であることを $x \in A$ （または $A \ni x$ ）と書き、「 x は A に属する」と読む。 x が A の要素でないことを $x \notin A$ と書く。

例 1

- (1) 「1 以上 5 以下の整数の集まり」は集合である。3 はこの集合に属し、6 や $\frac{1}{2}$ は属さない。
- (2) 「大きな数の集まり」は集合ではない。100 が「大きい」かどうかははっきり決まらないからである。

よく使う数の集合には、決まった記号がある。

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\} \text{ (自然数)}, \quad \mathbb{Z} \text{ (整数)}, \quad \mathbb{Q} \text{ (有理数)}, \quad \mathbb{R} \text{ (実数)}, \quad \mathbb{C} \text{ (複素数)}.$$

このシリーズでは、高校と同じく $\mathbb{N}$ に 0 を含めない。本によっては $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ と 0 を含めるので、教科書の約束を確認しよう。

集合の書き方には、次の 2 通りがある。

- **外延的記法**：要素を全部並べる。例： $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- **内包的記法**：要素がみたす条件を書く。例： $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq x \leq 5\}$.

内包的記法 $\{x \in X \mid P(x)\}$ は、「 X の要素 x のうち、条件 $P(x)$ をみたすものの集まり」と読む。 $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ のように、「この形で書けるものの集まり」という書き方もよく使う（これは偶数全体の集合である）。縦棒「 $\mid$ 」の代わりにコロン「 $:$ 」やセミコロンを使う本もある。

注意

- 集合では、要素を並べる順番や重複は関係ない. $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{1, 2, 2, 3\}$.
- 1 と $\{1\}$ は別物である. 1 は数で, $\{1\}$ は「1 だけを要素にもつ集合」である. $1 \in \{1\}$ だが, $1 \neq \{1\}$.

定義 2 空集合・有限集合

要素を1つももたない集合を**空集合**といい, $\emptyset$ で表す. 要素の個数が有限である集合を**有限集合**, そうでない集合を**無限集合**という. 有限集合 A の要素の個数を $|A|$ で表す (本によっては $\#A$, 高校では $n(A)$).

たとえば $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = -1\} = \emptyset$, $|\{1, 3, 5\}| = 3$, $|\emptyset| = 0$ である. 無限集合の「個数」をどう比べるかは, 第3章(濃度)の大きなテーマになる.

■ 2. 部分集合と相等

定義 3 部分集合

集合 A の要素がすべて集合 B の要素でもあるとき, すなわち

$$x \in A \text{ ならば } x \in B$$

が成り立つとき, A は B の**部分集合**であるといい, $A \subset B$ (または $B \supset A$) と書く. $A \subset B$ かつ $A \neq B$ のとき, A は B の**真部分集合**であるといい, $A \subsetneq B$ と書く.

このシリーズでは, $\subset$ は「等しい場合も含む」意味で使う ($A \subset A$ である). 本によっては, 等しい場合を含むものを $\subseteq$, 真部分集合を $\subset$ と書くので注意しよう.

定義 4 集合の相等

集合 A, B がまったく同じ要素からなるとき, A と B は**等しい**といい, $A = B$ と書く.

定理 1

- (1) $A = B \iff A \subset B$ かつ $B \subset A$.
- (2) どんな集合 A についても, $\emptyset \subset A$, $A \subset A$.
- (3) $A \subset B$ かつ $B \subset C$ ならば, $A \subset C$.

【証明】 (1) 「 A の要素はすべて B にあり, B の要素はすべて A にある」ことは, 「 A と B が同じ要素からなる」ことにほかならない.

(2) $\emptyset \subset A$ を示すには, 「 $x \in \emptyset$ ならば $x \in A$ 」を示せばよい. $x \in \emptyset$ となる x は1つもないので, 反例がなく, この主張は成り立つ (このような「仮定をみたすものがないので正しい」という考え方は No.2 で詳しく扱う). $A \subset A$ は明らか.

(3) $x \in A$ とすると, $A \subset B$ より $x \in B$. $B \subset C$ より $x \in C$. よって $A \subset C$. □

定理1 (1) は, 集合が等しいことを示すときの基本の方法である. 「 $A \subset B$ 」と「 $B \subset A$ 」の2つに分けて示す. そして「 $A \subset B$ 」を示すには, 「 $x \in A$ とする」から始めて「 $x \in B$ 」にたどりつけばよい. この方法を, ここでは「**要素を追いかける**」と呼ぶことにする.

「 $\in$ 」と「 $\subset$ 」の違い

$\in$ は「要素と集合」の関係, $\subset$ は「集合と集合」の関係である.

$$1 \in \{1, 2\}, \quad \{1\} \subset \{1, 2\}, \quad \{1\} \notin \{1, 2\}, \quad 1 \not\subset \{1, 2\} \text{ (意味をなさない).}$$

ただし, 集合の要素が集合であることもある. $A = \{1, \{1\}\}$ なら, $\{1\} \in A$ (2 番目の要素) と $\{1\} \subset A$ ($1 \in A$ だから) の両方が成り立つ.

例題 1

$A = \{6n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ とする. $A \subsetneq B$ であることを示せ.

【解答】 $A \subset B$ であること: $x \in A$ とすると, ある整数 n を使って $x = 6n$ と書ける. $x = 2 \cdot (3n)$ で $3n \in \mathbb{Z}$ なので, $x \in B$.

$A \neq B$ であること: $2 = 2 \cdot 1$ なので $2 \in B$. 一方, $2 = 6n$ をみたす整数 n はないので $2 \notin A$. よって $B \not\subset A$ であり, $A \neq B$. 以上より $A \subsetneq B$.

■ 3. 集合の演算

定義 5 和集合・共通部分・差集合


集合 A, B に対して, 次のように定める.

- **和集合**: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ または } x \in B\}$
- **共通部分** (積集合): $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ かつ } x \in B\}$
- **差集合**: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ かつ } x \notin B\}$ (本によっては $A - B$)

$A \cap B = \emptyset$ のとき, A と B は**互いに素** (または交わらない) という.

定義 6 全体集合と補集合

考える対象をすべて含む集合 U を決めておくとき, U を**全体集合**という. $A \subset U$ に対して, $A^c = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}$ を A の**補集合**という. (高校では $\bar{A}$ と書いた. 本によっては A^c と書く.)



このような図を**ベン図**という. 色をつけた部分がそれぞれの集合を表す.

例 2

- (1) $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ (偶数), $B = \{3, 6, 9\}$ (3の倍数) のとき,
 $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$, $A \cap B = \{6\}$, $A \setminus B = \{2, 4, 8, 10\}$, $A^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.
- (2) 実数の区間 $A = [0, 2]$, $B = (1, 3)$ のとき, $A \cup B = [0, 3]$, $A \cap B = (1, 2]$, $A \setminus B = [0, 1]$,
 $B \setminus A = (2, 3)$. 端点が入るかどうか ([] か () か) に注意しよう.

■ 4. 演算法則

定理 2 集合の演算法則

集合 A, B, C について, 次が成り立つ ((5), (6) は全体集合 U の部分集合で考える).

- (1) 交換法則: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
- (2) 結合法則: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- (3) 分配法則: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- (4) $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$
- (5) $(A^c)^c = A$, $A \setminus B = A \cap B^c$
- (6) ド・モルガンの法則: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

結合法則があるので, $A \cup B \cup C$ や $A \cap B \cap C$ はかっこなしで書いてよい. 数の計算の分配法則 $a(b+c) = ab+ac$ と違い, 集合では $\cap$ と $\cup$ のどちらを「外」にしても分配法則が成り立つ.

【証明】分配法則の1つ目とド・モルガンの法則の1つ目を, 要素を追いかけて示す. 残りも同じように示せる.

分配法則: (⊂) $x \in A \cap (B \cup C)$ とすると, $x \in A$ かつ「 $x \in B$ または $x \in C$ 」. $x \in B$ のときは $x \in A \cap B$, $x \in C$ のときは $x \in A \cap C$ なので, どちらの場合も $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(⊃) $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ とすると, $x \in A \cap B$ または $x \in A \cap C$. どちらの場合も $x \in A$ であり, さらに $x \in B$ または $x \in C$, すなわち $x \in B \cup C$. よって $x \in A \cap (B \cup C)$.

ド・モルガンの法則: $x \in U$ について,

$$x \in (A \cup B)^c \iff \text{「} x \in A \text{ または } x \in B \text{」ではない} \iff x \notin A \text{ かつ } x \notin B \iff x \in A^c \cap B^c.$$

ここで「『 p または q 』ではない」と「『 p でない』かつ『 q でない』」が同じ意味であることを使った (No.2 定理 2). □

ベン図は証明ではない

ベン図は式の意味をつかんだり, 答えを予想したりするのにとても便利である. しかし, ベン図は「よくある位置関係」を1つ描いたものにすぎず, すべての場合を尽くしているとは限らない (集合が4つ以上になると, すべての位置関係を円で描くこともできない). 証明は, 要素を追いかけて文章で書こう.

例題 2

$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ を示せ.

【解答】 定理 2 (5) と (6), および $\cap$ の交換法則・結合法則を使うと,

$$A \setminus (B \cup C) = A \cap (B \cup C)^c = A \cap (B^c \cap C^c) = (A \cap B^c) \cap (A \cap C^c) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

3つ目の等号は, $A \cap A = A$ を使って A を2つに分けた ($A \cap B^c \cap C^c = A \cap A \cap B^c \cap C^c$ を並べかえた). 要素を追いかけて, 「 $x \in A$ かつ $x \notin B$ かつ $x \notin C$ 」と両辺を言いかえて示してもよい.

■ 5. 冪集合と直積

定義 7 冪集合

集合 A の部分集合全体の集合を A の**冪集合** (べき集合) といい, $\mathcal{P}(A)$ で表す (本によっては 2^A).

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subset A\}.$$

例 3

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. $\emptyset$ と A 自身も A の部分集合なので, 忘れずに入れる. 「要素が集合である集合」の代表例である. たとえば $\{a\} \in \mathcal{P}(\{a, b\})$ であって, $a \in \mathcal{P}(\{a, b\})$ ではない.

定理 3

A が n 個の要素をもつ有限集合ならば, $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

【証明】 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ とする. 部分集合 X を1つ作るには, 各 a_i について「 X に入れる」か「入れない」かの2通りを選べばよく, 選び方が違えば違う部分集合ができる. よって部分集合は $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$ 個ある. $\square$

この「入れる／入れない」を1／0で表すと, 部分集合と「長さ n の0,1の列」が1対1に対応する. この見方は第3章で無限集合を考えるとときに大活躍する.

定義 8 直積

集合 A, B に対して, $a \in A$ と $b \in B$ の組 (a, b) 全体の集合

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

を A と B の**直積**という. (a, b) を**順序対**といい, $(a, b) = (a', b') \iff a = a'$ かつ $b = b'$ と約束する. $A \times A$ を A^2 とも書く. 3つ以上の直積 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ も同様に定める.

例 4

- (1) $\{1, 2\} \times \{a, b, c\} = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$. 一般に, 有限集合なら $|A \times B| = |A| |B|$ である.
- (2) $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ は座標平面, $\mathbb{R}^3$ は座標空間である. 分野「線形代数」第4章 No.1 で扱った数ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ も, 集合としては $\mathbb{R}$ の n 個の直積である.

注意

順序対は「順序つき」なので, $(1, 2) \neq (2, 1)$ である (集合 $\{1, 2\} = \{2, 1\}$ とは違う). そのため, 一般に $A \times B \neq B \times A$. たとえば $\{1\} \times \{2\} = \{(1, 2)\}$, $\{2\} \times \{1\} = \{(2, 1)\}$.

コラム：「すべての集合の集合」は作れない（ラッセルのパラドックス）

「条件をみたすものの集まり」はいつでも集合になるのだろうか． $x \notin x$ （自分自身を要素にもたない）という条件で $R = \{x \mid x \notin x\}$ を作ってみる．もし $R \in R$ なら， R の条件から $R \notin R$ となり矛盾．もし $R \notin R$ なら，条件をみたすので $R \in R$ となり，また矛盾．これが 1901 年にラッセルが見つけたパラドックスである．

そこで現代の数学では，内包的記法は「すでにある集合 X の中から選ぶ」形 $\{x \in X \mid P(x)\}$ で使う，などのルール（公理）を決めて集合を扱う．このルールの体系を公理的集合論（ZFC）という．このシリーズでは公理には深入りせず，ふだんの数学で困らない範囲で集合を使っていく．ZFC の C（選択公理）には第 4 章 No.3 で出会う．

■ 練習問題

1. 次の集合を外延的記法で表せ．

$$(1) \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 10\} \quad (2) \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 = x\} \quad (3) \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ は } 12 \text{ の約数}\}$$

2. $A = \{1, \{2\}, \{1, 2\}\}$ とする．次の (1)～(8) の正誤を答えよ．

$$(1) 1 \in A \quad (2) 2 \in A \quad (3) \{2\} \in A \quad (4) \{2\} \subset A$$

$$(5) \{1\} \subset A \quad (6) \{1, 2\} \subset A \quad (7) \{1, 2\} \in A \quad (8) \emptyset \subset A$$

3. 全体集合を $U = \{1, 2, \dots, 12\}$ とし， A を U の中の 2 の倍数全体， B を 3 の倍数全体とする． $A \cap B$ ， $A \cup B$ ， $A \setminus B$ ， $(A \cup B)^c$ ， $A^c \cap B^c$ を求め，ド・モルガンの法則が成り立っていることを確かめよ．

4. $\mathbb{R}$ の区間 $A = [-1, 3)$ ， $B = (0, 5]$ について， $A \cup B$ ， $A \cap B$ ， $A \setminus B$ ， $B \setminus A$ を求めよ．

5. 次の (1)，(2) を示せ．

$$(1) A \subset B \iff A \cap B = A \quad (2) A \subset B \iff A \cup B = B$$

6. $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ を A と B の対称差という． $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ を示せ．また， $A \triangle B$ をベン図で表せ．

7. 次の冪集合を外延的記法で表せ．

$$(1) \mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \quad (2) \mathcal{P}(\emptyset) \quad (3) \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$$

8. (考えてみよう)

(a) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ を示せ．

(b) $(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$ は一般には成り立たない．反例をあげよ．また，一般に成り立つ包含関係（ $\subset$ か $\supset$ か）はどちらか．

■ 練習問題の解答

1. (1) $x^2 < 10$ をみたす整数は $-3 \leq x \leq 3$ なので, $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

(2) $x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0$ より $\{-1, 0, 1\}$.

(3) $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$.

2. A の要素は $1, \{2\}, \{1, 2\}$ の3つである (2 そのものは要素ではない).

(1) 正. (2) 誤. (3) 正. (4) 誤 ($\{2\} \subset A$ には $2 \in A$ が必要). (5) 正 ($1 \in A$). (6) 誤 ($2 \notin A$). (7) 正. (8) 正 (定理1 (2)).

3. $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, $B = \{3, 6, 9, 12\}$ より,

$$A \cap B = \{6, 12\}, \quad A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}, \quad A \setminus B = \{2, 4, 8, 10\}.$$

$(A \cup B)^c = \{1, 5, 7, 11\}$. $A^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, $B^c = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$ より $A^c \cap B^c = \{1, 5, 7, 11\}$. 両者は等しく, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ が成り立っている.

4. $A \cup B = [-1, 5]$, $A \cap B = (0, 3)$, $A \setminus B = [-1, 0]$, $B \setminus A = [3, 5]$. ($0 \notin B$ なので $0 \in A \setminus B$, $3 \notin A$ なので $3 \in B \setminus A$.)

5. (1) $(\Rightarrow) A \cap B \subset A$ はつねに成り立つ. 逆に $x \in A$ とすると, $A \subset B$ より $x \in B$ なので $x \in A \cap B$. よって $A \cap B = A$.

$(\Leftarrow) x \in A$ とすると, $A = A \cap B$ より $x \in A \cap B$, 特に $x \in B$. よって $A \subset B$.

(2) $(\Rightarrow) B \subset A \cup B$ はつねに成り立つ. $x \in A \cup B$ とすると, $x \in A$ なら $A \subset B$ より $x \in B$, $x \in B$ ならそのまま. よって $A \cup B \subset B$ で, $A \cup B = B$.

$(\Leftarrow) x \in A$ とすると $x \in A \cup B = B$. よって $A \subset B$.

6. 要素を追いかける. $x \in A \triangle B$ とすると, 「 $x \in A$ かつ $x \notin B$ 」または「 $x \in B$ かつ $x \notin A$ 」. どちらの場合も $x \in A \cup B$ で, x は A, B の一方にしか属さないのだから $x \notin A \cap B$. よって $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. 逆に $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ とする. $x \in A$ のときは, $x \notin A \cap B$ より $x \notin B$ なので $x \in A \setminus B$. $x \in B$ のときも同様に $x \in B \setminus A$. よって $x \in A \triangle B$.

ベン図では, 2つの円のうち重なっていない部分 (三日月形2つ) に色をつけたものになる.

7. (1) $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ ($2^3 = 8$ 個).

(2) $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. 空集合の部分集合は空集合だけなので, 要素は1個である ($2^0 = 1$). $\{\emptyset\}$ は空集合ではないことに注意.

(3) $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ は要素を1個もつので, その部分集合は $\emptyset$ と $\{\emptyset\}$ の2個. よって $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

8. (a) $(x, y) \in A \times (B \cup C) \iff x \in A$ かつ 「 $y \in B$ または $y \in C$ 」 $\iff$ 「 $x \in A$ かつ $y \in B$ 」 または 「 $x \in A$ かつ $y \in C$ 」 $\iff (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$.

(b) $A = B = \{1\}$, $C = D = \{2\}$ とすると, $(A \times B) \cup (C \times D) = \{(1, 1), (2, 2)\}$ だが, $(A \cup C) \times (B \cup D) = \{1, 2\}^2$ は $(1, 2)$ も含む. 一般には $(A \times B) \cup (C \times D) \subset (A \cup C) \times (B \cup D)$ が成り立つ (左辺の要素 (x, y) は $x \in A \cup C$, $y \in B \cup D$ をみたすから). A, B, C, D を区間として座標平面に描くと, 左辺は2つの長方形 $A \times B, C \times D$ だが, 右辺はそれに $A \times D, C \times B$ を加えた4つの長方形の和になる.