

No.1 順序関係

この回のゴール

- 二項関係について、反射律・対称律・反対称律・推移律を判定できる.
- 同値関係から同値類・商集合を作り、同値類が集合を「分割」することを説明できる.
- 半順序と全順序を区別し、ハッセ図をかける.
- 最大元と極大元、上界と上限を区別できる. 整列集合の定義を述べられる.

■ 1. 二項関係

「 $=$ 」「 $\leq$ 」「 $\subset$ 」「割り切る」「合同」など、数学には 2 つのものの「関係」がたくさん出てくる. これらを集合の言葉で統一的に扱おう.

定義 1 二項関係

集合 A に対して、直積 $A \times A$ の部分集合 R を A 上の**二項関係** (または単に関係) という. $(a, b) \in R$ のとき $a R b$ と書き, 「 a と b は関係 R にある」という.

関係を「部分集合」として定義するのは、写像をグラフ ($A \times B$ の部分集合) で定義したのと同じ考え方である (第 2 章 No.1). たとえば $\mathbb{R}$ 上の関係 $\leq$ は、座標平面の部分集合 $\{(x, y) \mid x \leq y\}$ (直線 $y = x$ とその上側) である.

定義 2 関係の性質

集合 A 上の関係 R について、次の性質を考える.

- **反射律**: すべての $a \in A$ で $a R a$.
- **対称律**: $a R b$ ならば $b R a$.
- **反対称律**: $a R b$ かつ $b R a$ ならば $a = b$.
- **推移律**: $a R b$ かつ $b R c$ ならば $a R c$.

例 1

次の表で、○は成り立つ、×は成り立たないことを表す。

関係	反射律	対称律	反対称律	推移律
$\mathbb{R}$ 上の $=$	○	○	○	○
$\mathbb{R}$ 上の $\leq$	○	×	○	○
$\mathbb{R}$ 上の $<$	×	×	○	○
$\mathbb{N}$ 上の $a \mid b$ (a が b を割り切る)	○	×	○	○
$\mathcal{P}(X)$ 上の $\subset$	○	×	○	○
$\mathbb{Z}$ 上の $a \equiv b \pmod{3}$	○	○	×	○
$\mathbb{R}$ 上の $ x - y \leq 1$	○	○	×	×

$<$ の反対称律は、「 $a < b$ かつ $b < a$ 」となる a, b がないので、仮定をみたすものがなく成り立つ（第1章 No.2 の空集合の上の「すべて」と同じ考え方）。 $|x - y| \leq 1$ の推移律は、 $|0 - 1| \leq 1$, $|1 - 2| \leq 1$ だが $|0 - 2| > 1$ なので成り立たない。

■ 2. 同値関係と商集合

定義 3 同値関係・同値類・商集合

反射律・対称律・推移律をみたす関係を同値関係といい、 $a \sim b$ のように書く。 $a \in A$ に対して、 a と同値な要素全体の集合

$$[a] = \{x \in A \mid x \sim a\}$$

を a の同値類といい、 a をその代表元という。同値類全体の集合 $A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}$ を商集合という。

定理 1

$\sim$ を集合 A 上の同値関係とする。

(1) $a \in [a]$. (どの要素も、どれかの同値類に属する.)

(2) $a \sim b \iff [a] = [b]$.

(3) $[a] \neq [b]$ ならば $[a] \cap [b] = \emptyset$.

つまり、 A は互いに交わらない同値類に分割される。

【証明】(1) 反射律より $a \sim a$.

(2) $(\Rightarrow)$ $x \in [a]$ とすると $x \sim a$. $a \sim b$ と推移律より $x \sim b$, つまり $x \in [b]$. よって $[a] \subset [b]$. 対称律より $b \sim a$ でもあるので、同様に $[b] \subset [a]$. $(\Leftarrow)$ (1) より $a \in [a] = [b]$ なので $a \sim b$.

(3) 対偶を示す. $x \in [a] \cap [b]$ とすると $x \sim a$, $x \sim b$. 対称律と推移律より $a \sim b$ なので, (2) より $[a] = [b]$. □

例 2

(1) $\mathbb{Z}$ 上の $a \equiv b \pmod{3}$ の同値類は、3 で割った余りで分けた 3 つの集合

$$[0] = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\}, \quad [1] = \{\dots, -2, 1, 4, \dots\}, \quad [2] = \{\dots, -1, 2, 5, \dots\}$$

で、商集合は $\mathbb{Z}/\sim = \{[0], [1], [2]\}$. $[3] = [0]$, $[-1] = [2]$ のように、代表元のとり方は 1 通りではない. (合同式は分野「整数論」第 2 章 No.1 で詳しく扱う.)

(2) $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ 上で、 $(m, n) \sim (m', n') \iff mn' = m'n$ と定めると同値関係になる. (m, n) を分数 $\frac{m}{n}$ と思えば、 $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$ のように「値が等しい分数」を同じとみなす関係である. 有理数とは、この同値類のことだと考えられる.

商集合の上の写像

商集合の上で写像を定めるときは、代表元の選び方によらないこと (well-defined であること) を確かめる必要がある. 第 2 章 No.1 練習問題 1 (3) の $f(\frac{m}{n}) = m$ が写像にならなかったのは、同じ同値類の別の代表元 $(1, 2)$, $(2, 4)$ で値が変わってしまうからである. 一方、 $[(m, n)] \mapsto \frac{m^2}{n^2}$ は、 $mn' = m'n$ なら $m^2n'^2 = m'^2n^2$ となって値が代表元によらないので、写像として定まる.

3. 順序関係

定義 4 半順序・全順序



反射律・反対称律・推移律をみたす関係を**半順序** (または**順序**) といい、 $a \leq b$ のように書く. 半順序 $\leq$ が定められた集合 $(A, \leq)$ を**順序集合** (半順序集合) という. さらに、任意の $a, b \in A$ について $a \leq b$ または $b \leq a$ が成り立つ (どの 2 つも**比較可能**) とき、 $\leq$ を**全順序**といい、 $(A, \leq)$ を**全順序集合**という.

$a \leq b$ かつ $a \neq b$ のとき $a < b$ と書く. 数の大小と区別するため、一般の順序を $\leq$ と書く本もある.

例 3

- (1) $(\mathbb{R}, \leq)$, $(\mathbb{N}, \leq)$ は全順序集合.
- (2) $(\mathbb{N}, |)$ (割り切る関係) は半順序集合だが全順序ではない. 2 と 3 はどちらも他方を割り切らず、比較できない.
- (3) $(\mathcal{P}(X), \subset)$ は半順序集合. X が 2 個以上の要素をもてば全順序ではない ($\{a\}$ と $\{b\}$ は比較できない).
- (4) $\mathbb{R}^2$ 上で、 $(x, y) \leq (x', y') \iff$ 「 $x < x'$ 」または「 $x = x'$ かつ $y \leq y'$ 」と定めると全順序になる. これを**辞書式順序**という (辞書で 1 文字目から順に比べるのと同じ).

有限の順序集合は、**ハッセ図**で表すと分かりやすい. $a < b$ で、間に $a < c < b$ となる c がいないとき、 b を a の上に書いて線で結ぶ. 上に向かってたどれる 2 点が「 $\leq$ の関係にある」2 点である.

(a) 12 の約数, $|$ (b) $\mathcal{P}(\{a, b, c\}), \subset$

(a) では $2 \mid 12$ (2 から 4 や 6 を経て 12 へ上に行ける) だが, 4 と 6 は比較できない. (a) で 1 と 4 を直接結ばないのは, 間に 2 があるからである.

■ 4. 最大元・極大元・上限

定義 5 最大元・極大元

順序集合 $(A, \leq)$ の部分集合 S と $m \in S$ について,

- すべての $s \in S$ で $s \leq m$ のとき, m を S の**最大元**といい, $\max S$ と書く.
- $m < s$ となる $s \in S$ が存在しないとき, m を S の**極大元**という.

不等号を逆にして, **最小元** $\min S$, **極小元**を定める.

最大元は「すべてより上」, 極大元は「それより上がない」である. 比較できない要素があると, 両者は違ってくる.

定理 2

順序集合 $(A, \leq)$ の部分集合 S について,

- (1) S の最大元は, 存在すればただ 1 つである.
- (2) S の最大元は極大元である. さらに最大元が存在すれば, 極大元はそれだけである.
- (3) $\leq$ が全順序ならば, 極大元は最大元である.

【証明】 (1) m, m' がともに最大元なら, $m' \leq m$ かつ $m \leq m'$. 反対称律より $m = m'$.

(2) 最大元 m について $m < s$ ($s \in S$) とすると, $s \leq m$ と反対称律から $s = m$ となり矛盾. よって m は極大元. また m' を極大元とすると $m' \leq m$ で, $m' < m$ ではないので $m' = m$.

(3) 極大元 m と任意の $s \in S$ について, 全順序なので $s \leq m$ または $m \leq s$. 後方で $m \neq s$ なら $m < s$ となり極大性に反するので, いずれにしても $s \leq m$. $\square$

定義 6 上界・上限

順序集合 $(A, \leq)$ の部分集合 S について,

- すべての $s \in S$ で $s \leq u$ となる $u \in A$ を, S の**上界**という. 上界が存在するとき, S は**上に**
有界であるという.
- S の上界全体に最小元があるとき, それを S の**上限** (最小上界) といい, $\sup S$ と書く.

同様に**下界**, **下限** $\inf S$ (最大下界) を定める.

上界は S の外 (A の中) にあってもよい. 最大元は S の中になければならない. S に最大元があれば,

それが上限である.

例題 1

$(\mathbb{N}, |)$ の部分集合 $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ を, $|$ による順序集合と考える.

- (1) A の極大元, 極小元, 最大元, 最小元を求めよ.
- (2) A の部分集合 $\{4, 6\}$, $\{2, 3\}$, $\{8, 12\}$ について, A の中での上界と上限を求めよ.

【解答】 (1) 8 と 12 には, それより真に大きい (8, 12 の倍数で自分自身と異なる) A の要素がないので極大元. 2 と 3 には, それより真に小さい (2, 3 の約数で自分自身と異なる) A の要素がないので極小元. 4 と 6 は $4 \mid 8$, $6 \mid 12$ なので極大元でなく, 4, 6, 8, 12 は 2 で割り切れるので極小元でない. 極大元が 2 つあるので最大元はなく, 極小元が 2 つあるので最小元もない (定理 2 (2)).

(2) $\{4, 6\}$ の上界は「4 と 6 の公倍数で A に属するもの」なので 12 だけで, 上限は 12. $\{2, 3\}$ の上界は 6, 12 で, その最小元は 6 ($6 \mid 12$) なので, 上限は 6. $\{8, 12\}$ の公倍数は 24 の倍数で, A には属さない, 上界はなく, 上限もない. ($(\mathbb{N}, |)$ 全体で考えれば, $\sup\{a, b\}$ は最小公倍数, $\inf\{a, b\}$ は最大公約数である.)

例 4

$(\mathbb{Q}, \leq)$ で $S = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ を考える. 1.5 や 2 は上界である. 一方, $\sqrt{2}$ は有理数でない, $(\mathbb{Q}, \leq)$ における上界ではない (上界は順序集合 $\mathbb{Q}$ の要素でなければならない). 上界全体は $\sqrt{2}$ より大きい有理数全体であり, その中に最小元は存在しない (どんな上界 u に対しても, $\sqrt{2} < u' < u$ となる有理数 u' がとれる). よって $(\mathbb{Q}, \leq)$ では S の上限は存在しない. $(\mathbb{R}, \leq)$ で考えれば $\sup S = \sqrt{2}$ である. 「上に有界な空でない部分集合には必ず上限がある」ことが実数の連続性で, 分野「解析学」第 1 章 No.2 の主題である.

■ 5. 整列集合

定義 7 整列集合

全順序集合 $(A, \leq)$ で, 空でないどんな部分集合にも最小元があるものを整列集合という.

例 5

- (1) $(\mathbb{N}, \leq)$ は整列集合である ($\mathbb{N}$ の整列性). 第 3 章 No.1 定理 3 の証明で使った性質で, 数学的帰納法の根拠でもある.
- (2) $(\mathbb{Z}, \leq)$ は整列集合でない ($\mathbb{Z}$ 自身に最小元がない).
- (3) $([0, 1], \leq)$ は全体の最小元 0 をもつが, 整列集合でない. 部分集合 $(0, 1]$ に最小元がない.

$\mathbb{R}$ には, ふつうの $\leq$ とは別の全順序を入れて, 整列集合にすることができるだろう. 実は「どんな集合にも, 整列集合になるような全順序を入れられる」(整列可能定理). しかし, $\mathbb{R}$ に対してそのような順序を具体的に書き下した人はいない. この不思議な定理は No.3 で選択公理とともに扱う.

コラム：同値関係は「同一視」の道具

同値関係と商集合は、「違うものを同じとみなす」ための道具である．例2(2)で分数から有理数を作ったように，大学数学では多くの対象がこの方法で作られる．

- 群を正規部分群で「割った」商群（分野「代数学」第3章 No.2）
- 整数を余りで同一視した $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ （分野「整数論」第2章 No.1，分野「代数学」第5章 No.3）
- 正方形の向かい合う辺を同一視して作るトーラス（ドーナツの表面）

「同値類」という言葉に出会ったら、「何と何を同じとみなしているのか」を考えるとよい．

■ 練習問題

1. $A = \{1, 2, 3\}$ 上の次の関係について，反射律・対称律・反対称律・推移律が成り立つかを調べよ．同値関係ならば同値類を，半順序ならばハッセ図を答えよ．
 - (1) $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$
 - (2) $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (1, 3)\}$
 - (3) $R_3 = \{(1, 2), (2, 1)\}$
2. $\mathbb{R}$ 上で $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}$ と定める． $\sim$ が同値関係であることを示せ．また，各同値類は $[0, 1)$ の要素をちょうど1つ含むことを示せ．
3. $(\mathbb{N}, |)$ が半順序集合であることを示せ．また， $\mathbb{Z}$ 上の $|$ は反対称律をみたさないことを示せ．
4. 30 の正の約数全体を $|$ による順序集合と考えて，ハッセ図をかけ．また，それが $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$ のハッセ図と同じ形になる理由を説明せよ．
5. $(\mathbb{N}, |)$ の部分集合 $S = \{4, 6, 10\}$ について， S の最大元・最小元・極大元・極小元を求めよ．また， $\mathbb{N}$ の中での $\sup S$ と $\inf S$ を求めよ．
6. (考えてみよう) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ に辞書式順序 $(m, n) \leq (m', n') \iff \text{「}m < m'\text{」 または 「}m = m' \text{ かつ } n \leq n'\text{」}$ を入れる．
 - (a) これは整列集合であることを示せ．
 - (b) 順序を保つ全単射 $f: (\mathbb{N}, \leq) \rightarrow (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq)$ ($a \leq b \iff f(a) \leq f(b)$ をみたす全単射) は存在しないことを示せ．

■ 練習問題の解答

1. (1) 反射律○, 対称律○, 反対称律 $\times$ ($1R_12, 2R_11$ だが $1 \neq 2$), 推移律○. 同値関係で, 同値類は $\{1, 2\}, \{3\}$.
 (2) 反射律○, 対称律 $\times$, 反対称律○, 推移律○. 半順序で, ハッセ図は 1 の上に 2 と 3 が並び, $1-2, 1-3$ を線で結んだもの (2 と 3 は比較できない).
 (3) 反射律 $\times$ ($(1,1) \notin R_3$), 対称律○, 反対称律 $\times$, 推移律 $\times$ ($1R_32, 2R_31$ だが $(1,1) \notin R_3$).
2. 反射律: $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$. 対称律: $x - y \in \mathbb{Z}$ なら $y - x = -(x - y) \in \mathbb{Z}$. 推移律: $x - y, y - z \in \mathbb{Z}$ なら $x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Z}$.
 x の同値類 $[x] = \{x + n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ について, $n = -[x]$ ($[x]$ は x 以下の最大の整数) とすると $x + n = x - [x] \in [0, 1)$. また $x + n, x + n'$ がともに $[0, 1)$ に入れば, 差 $n - n'$ は整数で $|n - n'| < 1$ なので $n = n'$. よってちょうど 1 つ. (商集合 $\mathbb{R}/\sim$ は $[0, 1)$ と 1 対 1 に対応する. 0 と 1 を同一視した「円周」と考えることもできる.)
3. 反射律: $a = 1 \cdot a$. 推移律: $b = ka, c = lb$ なら $c = (kl)a$. 反対称律: $a \mid b, b \mid a$ なら $b = ka, a = lb$ ($k, l \in \mathbb{N}$) で, $a = kla$ より $kl = 1, k = l = 1$. よって $a = b$. $\mathbb{Z}$ では $2 \mid (-2)$ かつ $(-2) \mid 2$ だが $2 \neq -2$ なので, 反対称律をみたさない ($k = l = -1$ があろう).
4. 約数は 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 下から 1; 2, 3, 5; 6, 10, 15; 30 の 4 段に並べ, $1-2, 1-3, 1-5, 2-6, 2-10, 3-6, 3-15, 5-10, 5-15, 6-30, 10-30, 15-30$ を結ぶ (立方体の形).
 $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ なので, 約数 d は「2, 3, 5 のどれを使うか」で決まり, $d \mapsto \{p \in \{2, 3, 5\} \mid p \mid d\}$ は $\{1, \dots, 30 \text{ の約数}\}$ から $\mathcal{P}(\{2, 3, 5\})$ への全単射である. しかも $d \mid d' \iff (d \text{ の素因数の集合}) \subset (d' \text{ の素因数の集合})$ なので, 順序もそのまま対応する.
5. 4, 6, 10 のどれも, 自分以外の 2 つを割り切らず, 自分以外の 2 つで割り切れもしない. つまり, どの要素についても, それより真に大きい要素も真に小さい要素も S にないので, 3 つとも極大元かつ極小元. 最大元も最小元もない. $\sup S = \text{lcm}(4, 6, 10) = 60, \inf S = \text{gcd}(4, 6, 10) = 2$.
6. (a) 全順序であることは定義から確かめられる. $\emptyset \neq T \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ をとる. T の要素の第 1 成分全体は $\mathbb{N}$ の空でない部分集合なので, 最小値 m_0 がある ($\mathbb{N}$ の整列性). 第 1 成分が m_0 である T の要素の第 2 成分全体にも最小値 n_0 がある. (m_0, n_0) が T の最小元である.
 (b) $(2, 1)$ より小さい要素は $(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots$ と無限個ある. 一方 $(\mathbb{N}, \leq)$ では, どの k についても k より小さい要素は $k - 1$ 個しかない. f が順序を保つ全単射なら, $f(k) = (2, 1)$ となる k より小さい要素は f で $(2, 1)$ より小さい要素に 1 対 1 に写るので, 個数が一致しなければならず, 矛盾. (集合としては $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ (第 3 章 No.1 定理 2) なのに, 「順序の形」としては違う. 順序まで込めた「長さ」を表すのが順序数である.)