

No.2 ツォルンの補題

この回のゴール

- 鎖・帰納的順序集合の定義を述べ、ツォルンの補題の主張を正確に言える。
- ツォルンの補題を使って、どんなベクトル空間にも基底があることを証明できる。
- ツォルンの補題を使う証明の「型」を理解し、ほかの場面に当てはめられる。
- 有限の場合にはツォルンの補題がいらないことを説明できる。

■ 1. 極大元はいつ存在するか

数学では、「これ以上大きくできないもの」（極大なもの）を見つきたい場面がよくある。たとえば、1 次独立なベクトルの集合を「これ以上ベクトルを付け加えると 1 次独立でなくなる」ところまで大きくすれば、それは基底になる（分野「線形代数」第 4 章 No.3）。

空でない有限の順序集合なら、極大元はいつでも存在する。要素を 1 つとり、それより大きい要素があれば乗りかえる、ということをくり返せば、有限回で止まるからである（練習問題 3）。しかし無限の順序集合では、極大元があるとは限らない。

- $(\mathbb{N}, \leq)$ や $(\mathbb{R}, \leq)$ には極大元がない。どこまでも上に行ける。
- $([0, 1), \leq)$ にも極大元がない。 $\mathbb{R}$ で考えたときの上限 1 が $[0, 1)$ の外にあり、1 に向かう列が「行き先を失う」。

どちらも、「上へ上へと続く列」が集合の中に上界をもたないことが原因である。逆に、それさえ防げば極大元がある、というのがツォルンの補題である。

定義 1 鎖・帰納的順序集合

順序集合 $(A, \leq)$ について、

- (1) A の部分集合 C で、 $\leq$ が C の上で全順序になっている（ C のどの 2 つの要素も比較可能な）ものを A の鎖（または全順序部分集合）という。
- (2) $A \neq \emptyset$ で、 A のどの鎖も A の中に上界をもつとき、 A は帰納的であるという。

空集合も鎖であり、その上界は「 A の任意の要素」なので、空集合の鎖の上界があることは $A \neq \emptyset$ と同じことである。本によっては「空でない鎖」だけを考え、 $A \neq \emptyset$ を別に仮定している。

定理 1 ツォルンの補題

帰納的な順序集合には、極大元が存在する。

「補題」という名前だが、この主張は第 3 章までに使ってきた考え方からは証明できず、No.3 で扱う選択公理と同値である。このシリーズでは、ツォルンの補題を「認めて使う道具」として扱い、選択公理から導く証明は省略する（教科書に任せる。No.3 で考え方を紹介する）。

例 1

- (1) $([0, 1], \leq)$ は帰納的である (どの鎖も上界 1 をもつ). 極大元は 1.
- (2) $([0, 1], \leq)$ は帰納的でない. 鎖 $[0, 1)$ 自身が $[0, 1)$ の中に上界をもたない.
- (3) 集合 X に対して, $(\mathcal{P}(X), \subset)$ は帰納的である. 鎖 $\mathcal{C}$ に対して, 和集合 $\bigcup_{S \in \mathcal{C}} S$ が上界になる. 極大元は X .

例 1 (3) の「鎖の和集合が上界になる」は, ツォルンの補題を使うときのいちばん典型的な形である.

■ 2. ベクトル空間の基底の存在

分野「線形代数」では, 有限次元のベクトル空間を中心に考えた. ここでは, 無限次元の場合も含めて「どんなベクトル空間にも基底がある」ことを示す. K を $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}$ などとし, K 上のベクトル空間 V を考える.

定義 2 無限集合の 1 次独立と基底

$S \subset V$ (無限集合でもよい) について,

- (1) S の有限個の要素の 1 次結合全体を $\langle S \rangle$ と書く ($\langle \emptyset \rangle = \{0\}$).
- (2) S のどの有限部分集合も 1 次独立であるとき, S は 1 次独立であるという.
- (3) S が 1 次独立で, $\langle S \rangle = V$ のとき, S を V の基底という.

無限個のベクトルの「和」は (収束を考えないと) 意味をもたないので, 1 次結合はいつも有限個で考える. S が有限集合なら, 分野「線形代数」第 4 章 No.2・No.3 の定義と一致する.

例 2

実数の数列全体のベクトル空間 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ の中で, 第 n 項だけが 1 で他が 0 の数列を e_n とする. $\{e_1, e_2, \dots\}$ は 1 次独立だが, $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ の基底ではない. $\langle e_1, e_2, \dots \rangle$ は「有限個の項以外は 0」の数列全体であり, $(1, 1, 1, \dots)$ を含まないからである.

定理 2

$S \subset V$ が 1 次独立で, $v \in V$ が $v \notin \langle S \rangle$ ならば, $S \cup \{v\}$ も 1 次独立である.

【証明】 $S \cup \{v\}$ の有限部分集合の 1 次関係 $cv + c_1s_1 + \dots + c_k s_k = 0$ ($s_i \in S$ は相異なる) を考える. $c \neq 0$ なら $v = -\frac{1}{c}(c_1s_1 + \dots + c_k s_k) \in \langle S \rangle$ となり矛盾. よって $c = 0$ で, S の 1 次独立性より $c_1 = \dots = c_k = 0$. □

定理 3 基底の存在

どんなベクトル空間 V にも基底が存在する.

【証明】 V の 1 次独立な部分集合全体を $\mathcal{A}$ とし, 包含関係 $\subset$ で順序集合と考える.

$\mathcal{A} \neq \emptyset$: $\emptyset$ は 1 次独立 (有限部分集合は $\emptyset$ だけで, 1 次関係がない) なので $\emptyset \in \mathcal{A}$.

鎖が上界をもつ: $\mathcal{C}$ を $\mathcal{A}$ の空でない鎖とし, $U = \bigcup_{S \in \mathcal{C}} S$ とおく. U が 1 次独立であることを示す. U の有限部分集合 $\{u_1, \dots, u_k\}$ をとると, 各 u_i はある $S_i \in \mathcal{C}$ に属する. $\mathcal{C}$ は鎖なので, $S_1, \dots, S_k$ は $\subset$ で一列に並び, その中に最大のも S_j がある. すべての u_i は S_j に属し, S_j は 1 次独立なので, $\{u_1, \dots, u_k\}$ は 1 次独立. よって $U \in \mathcal{A}$ で, U は $\mathcal{C}$ の上界である. (空の鎖の上界は $\emptyset$ でよい.)

ゆえに $\mathcal{A}$ は帰納的で、ツォルンの補題より極大元 B がある。

B は基底： B は 1 次独立. もし $\langle B \rangle \neq V$ なら, $v \notin \langle B \rangle$ をとると, 定理 2 より $B \cup \{v\}$ も 1 次独立で, $B \subsetneq B \cup \{v\}$ となり B の極大性に反する. よって $\langle B \rangle = V$. $\square$

例 3

$\mathbb{R}$ を $\mathbb{Q}$ 上のベクトル空間と考える (スカラー倍は有理数倍だけ). 定理 3 より, $\mathbb{Q}$ 上の基底 B がある. これを**ハメル基底**という. すべての実数が「 B の有限個の要素の有理数係数の 1 次結合」としてただ 1 通りに書ける. しかし, B を具体的に書き下した人はいない. ツォルンの補題は「存在する」ことだけを教えてくれるのである.

■ 3. ツォルンの補題の使い方

定理 3 の証明は, 次の「型」に従っている.

ツォルンの補題を使う証明の型

- (1) 「途中まで作ったもの」全体を集合 $\mathcal{A}$ とし, 「延長」の関係で順序を入れる. (定理 3 では, 1 次独立な集合を $\mathcal{C}$ で.)
- (2) $\mathcal{A} \neq \emptyset$ を確かめる. (たいてい「何もない状態」 $\emptyset$ が入る.)
- (3) 鎖の上界を作る. (たいてい鎖の要素の**和集合**. それが $\mathcal{A}$ に入ることを確かめるのが証明の山場.)
- (4) ツォルンの補題で極大元をとり, 「もし完成していなければ, もう 1 歩延長できて極大性に矛盾」と示す.

例題 1

全射 $f: A \rightarrow B$ には右逆写像 ($f \circ h = \text{id}_B$ となる $h: B \rightarrow A$) が存在することを, ツォルンの補題を使って示せ.

【解答】 (1) $D \subset B$ と写像 $h: D \rightarrow A$ の組 (D, h) で, すべての $b \in D$ について $f(h(b)) = b$ をみたすものの全体を $\mathcal{A}$ とする. $(D, h) \leq (D', h')$ を「 $D \subset D'$ かつ $h'|_D = h$ 」(h' は h の延長) と定めると, 半順序になる.

(2) 空集合からの写像 $h_\emptyset: \emptyset \rightarrow A$ を考えれば $(\emptyset, h_\emptyset) \in \mathcal{A}$.

(3) 空でない鎖 $\mathcal{C}$ に対して, $D^* = \bigcup_{(D, h) \in \mathcal{C}} D$ とし, $b \in D^*$ に対して $b \in D$ となる $(D, h) \in \mathcal{C}$ をとって $h^*(b) = h(b)$ と定める. 別の $(D', h') \in \mathcal{C}$ で $b \in D'$ でも, 鎖なので一方が他方の延長であり, $h(b) = h'(b)$. よって h^* は写像として定まり, $(D^*, h^*) \in \mathcal{A}$ は $\mathcal{C}$ の上界である.

(4) ツォルンの補題より極大元 (D, h) がある. $D \neq B$ なら, $b_0 \in B \setminus D$ をとり, f は全射なので $f(a_0) = b_0$ となる a_0 を 1 つとる. h を $D \cup \{b_0\}$ に $h(b_0) = a_0$ と延長すると $\mathcal{A}$ の要素になり, 極大性に反する. よって $D = B$ で, h が右逆写像である.

第 2 章 No.3 定理 5 (2) では「各 b について, いっせいに 1 つずつ選ぶ」ことで右逆写像を作った. 例題 1 では, (4) で選ぶのは **1 つだけ**である. 「無限回の選択」はツォルンの補題が肩代わりしているのである.

例 4 ほかの分野での使い方

同じ型で、次のようなことが示される。

- 環の（自分自身でない）イデアルは、極大イデアルに含まれる（分野「代数学」第 5 章 No.2 のイデアルを参照）。
- ハーン・バナッハの定理（線形汎関数の延長、分野「解析学」第 10 章）。
- 位相空間論のチコノフの定理（コンパクト空間の直積はコンパクト．コンパクト性は分野「位相空間論」第 3 章）。

■ 4. ツォルンの補題がいない場合

有限の場合はもちろん、「1 つずつ順番に」処理できる場合もツォルンの補題はいらない。たとえば V が可算個のベクトル $v_1, v_2, \dots$ で張られるなら、「 v_n がそれまでに選んだベクトルの 1 次結合で書けなければ加える」を $n = 1, 2, \dots$ と順に行えば、基底が得られる（ $\mathbb{N}$ の整列性と帰納法で済む）。ツォルンの補題が本当に必要になるのは、 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ や「 $\mathbb{Q}$ 上の $\mathbb{R}$ 」のように、番号をつけて順に処理することができないほど大きい場合である。

コラム：ハメル基底と「おかしい関数」

すべての実数 x, y で $f(x+y) = f(x) + f(y)$ をみたす関数を加法的関数という。 $f(x) = cx$ は加法的である。 f が連続なら、加法的関数はこれしかないことが知られている。ところがハメル基底を使うと、 $f(x) = cx$ の形でない（したがって連続でない）加法的関数が作れる（練習問題 6）。そのグラフは座標平面のどこにでもぎっしり点がある、とても「おかしい」ものになる。ツォルンの補題（選択公理）は、こうした直観に反する対象の存在も保証してしまう。No.3 でさらに例を見る。

■ 練習問題

発展 のついた問題は、この回の内容から一步踏み出した発展問題である。最初は飛ばして、ほかの問題が解けてから挑戦するとよい。

- 次の順序集合は帰納的か。また、極大元をすべて求めよ。
 - $(\mathcal{P}(X) \setminus \{X\}, \subset)$, ただし $X = \{1, 2, 3\}$
 - $\mathbb{N}$ の有限部分集合全体を $\subset$ で順序づけたもの
 - $(\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\mathbb{N}\}, \subset)$
- ベクトル空間 V の1次独立な部分集合 S は、 V のある基底に含まれることを、ツォルンの補題を使って示せ。
- 空でない有限の順序集合には極大元があることを、ツォルンの補題を使わずに示せ。
- $(A, \leq)$ が帰納的ならば、任意の $a \in A$ に対して、 $a \leq m$ となる極大元 m があることを示せ。
- (考えてみよう) $\mathbb{R}$ を $\mathbb{Q}$ 上のベクトル空間と考えたときの基底 (ハメル基底) B は、非可算集合であることを示せ。
- 発展** (考えてみよう) ハメル基底 B を1つとり、 $b_0 \in B$ を固定する。実数 x を $x = q_0 b_0 + q_1 b_1 + \cdots + q_k b_k$ ($q_i \in \mathbb{Q}$, $b_1, \dots, b_k \in B \setminus \{b_0\}$ は相異なる) と表したときの q_0 を $f(x)$ とする。 f は加法的関数 ($f(x+y) = f(x) + f(y)$) であるが、 $f(x) = cx$ の形ではないことを示せ。

■ 練習問題の解答

- (1) 帰納的. 有限集合なので, どの鎖も有限で, その最大の要素が上界になる (空の鎖には $\emptyset$). 極大元は $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ の3つ.

(2) 帰納的でない. 鎖 $\{1\} \subset \{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\} \subset \dots$ の上界は $\{1, 2, \dots, n\}$ をすべて含むので無限集合になり, この順序集合の中にない. 極大元もない (有限集合 S には $S \cup \{\max S + 1\}$ が真に大きい; $S = \emptyset$ なら $\{1\}$).

(3) 帰納的でない. (2) と同じ鎖の上界は $\mathbb{N}$ を含まねばならないが, $\mathbb{N}$ は除かれている. しかし極大元はある. $\mathbb{N} \setminus \{n\}$ ($n \in \mathbb{N}$) がそれである. 帰納的であることは極大元が存在するための十分条件であって, 必要条件ではないことが分かる.
- 1 次独立で S を含む部分集合全体を $\mathcal{A}$ とし, $\subset$ で順序づける. $S \in \mathcal{A}$ なので空でない. 鎖の和集合は, 定理3の証明と同じく1次独立で, S を含むので $\mathcal{A}$ に属し, 上界になる (空の鎖の上界は S). ツォルンの補題より極大元 B があり, 定理3の証明と同じく $\langle B \rangle = V$. よって B は S を含む基底.
- A の要素の個数を n とする. $a_1 \in A$ をとる. a_1 が極大元でなければ $a_1 < a_2$ となる a_2 があり, a_2 が極大元でなければ $a_2 < a_3$ となる a_3 がある. これを続けると $a_1 < a_2 < a_3 < \dots$ となり, 推移律と反対称律より a_i はすべて異なる. A には n 個しか要素がないので, この操作は n 回以内に止まり, 止まったところの a_k が極大元である.
- $A_a = \{x \in A \mid a \leq x\}$ を $\leq$ で順序集合と考える. $a \in A_a$ なので空でない. A_a の空でない鎖 C は A の鎖でもあるので, A の中に上界 u がある. C の要素 c について $a \leq c \leq u$ なので $u \in A_a$. よって A_a は帰納的. ツォルンの補題より A_a に極大元 m がある. $m < y$ ($y \in A$) なら $a \leq m < y$ より $y \in A_a$ なので, m の A_a での極大性に反する. よって m は A の極大元で, $a \leq m$.
- B が高々可算だとすると, B の有限部分集合の有理数係数の1次結合全体, すなわち $\langle B \rangle$ は, 「 B の要素の有限列と有理数の有限列の組」で表されるので高々可算になる (第3章 No.1 定理3を使う). しかし $\langle B \rangle = \mathbb{R}$ は非可算なので矛盾 (第3章 No.2 定理3).
- 加法的:** x, y の表し方に現れる B の要素をあわせて $b_0, b_1, \dots, b_k$ とし (係数が0のものも含めて), $x = \sum q_i b_i$, $y = \sum r_i b_i$ とすると, $x + y = \sum (q_i + r_i) b_i$. 表し方はただ1通りなので, $f(x + y) = q_0 + r_0 = f(x) + f(y)$.

cx の形でない: $f(b_0) = 1$. B は非可算 (練習問題5) なので, $b_1 \in B \setminus \{b_0\}$ がとれて, $f(b_1) = 0$. $f(x) = cx$ とすると, $f(b_0) = 1$ より $c \neq 0$. $b_1 \neq 0$ (1次独立な集合は $\mathbf{0}$ を含まない) なので $f(b_1) = cb_1 \neq 0$ となり矛盾.